

Carcinoma del cuello del útero

Enferma de 46 años, enjuta de carnes, color pajizo. Padece un *carcinoma del cuello del útero*, que se acompaña de leucorrea fétida, metrorragias, infarto bis inguinal, etc.

Tratamiento sintomático.—Para la metrorragia se administró, como astringente, el *hidrastis canadensis*; y contra la leucorrea fétida, inyecciones vaginales de permanganato potásico. No cohibiéndose el flujo sanguíneo, se prescribió el percloruro de hierro en solución azucarada, el cual, á más de hemostático, es hemoplástico, y por tanto podía oponerse algo á la caquexia de la enferma.

Prescribióse:

Solución percloruro de hierro á	
32° Beaumé.	1 gramo
Agua azucarada.	100 gramos


H. s. a. poción.

Aparte.

Permanganato potásico.	1 gramo
Agua destilada.	1,000 gramos

Practíquense irrigaciones vaginales.

La enferma obtuvo algún beneficio de la medicación anterior, pero hubo de sucumbir al poco tiempo ante los progresos de la caquexia cancerosa.



Clorosis

Herminia R. ..., de edad 18 años, dedicada á los quehaceres domésticos.

Anamnesis morbosa.—Gastralgias desde la edad de 9 á los 13 años; sarampión á los 14 años; disnea después del más ligero cansancio, falta de fuerzas y frecuentes crisis de cefalalgia á partir de aquella fecha.

Estado actual.—Conserva bastantes carnes, mejillas redondeadas, rostro de color pálido céreo, labios descoloridos y raicillas venosas aparentes al través de la piel en la raíz de la nariz y frente. Carácter melancólico. Debilidad de los tonos cardíacos, con refuerzo del segundo aórtico. No hay soplos. Pulso débil, frecuente y rítmico. Tres millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, pero con proporción normal de los leucocitos. Submatidez; disminución del murmullo vesicular y ligera broncofonía en los vértices pulmonares y disnea ante la más mínima fatiga. Crisis frecuentes de cefalalgia de carácter pungitivo y localización frontal.

Amenorrea. Estreñimiento.

Diagnóstico.—*Clorosis* (palidez, amenorrea, número de glóbulos rojos, etc.).

Los síntomas físicos obtenidos en la exploración de los vértices pulmonares que hacen recelar una pneumofimia, oscurecen el pronóstico.

Tratamiento.—Tónicos y reconstituyentes, preparados de hierro, etc. La nuez vómica ha sido preconizada en el tratamiento de la clorosis, suponiendo que ejerce una acción tónica sobre el sistema nervioso, principalmente sobre la médula.

Administraremos las sales solubles de hierro, al objeto de no favorecer el estreñimiento.

Lactato ferroso	0'30 gramo
Polvos de nuez vómica	0'05 »
Aloes.	0'10 »
Exc.	c. s.

H. s. a. píldoras núm. 3. Una antes de cada comida.

Observaciones clínicas.—Ha tenido epistaxis. Es preciso administrar un preparado de hierro que sea á la vez astringente (el sulfato, el percloruro, etc.), pero asociándolos á un laxante para evitar el estreñimiento.

Sulfato ferroso	} 1 gramo
Extracto ruibarbo	
Exc.	c. s.

H. s. a. 20 pild. Cuatro al día. Con los alimentos.

8 de Febrero.—No han repetido los epistaxis. No hay perturbaciones digestivas, ni síntomas por parte del sistema nervioso. Ambas mejillas ofrecen un tinte ligeramente rosado. No es tan pronunciado el descolorimiento de las mucosas. Han aumentado sus fuerzas. Puede pasear sin sufrir cansancio. No ha menstruado, á pesar de lo cual la enferma pidió el alta.



Catarro gástrico agudo

Filomena F..., de 18 años de edad, sin antecedentes morbosos gástricos. Tiene, desde hace tres días, cefalalgia, malestar general, plenitud gástrica.

Estado actual.—Lengua cubierta por una gruesa capa de saburra blanca, bordes limpios y sabor amargo. Dolor á la presión al nivel del hueco epigástrico, con ligera distensión. Náuseas frecuentemente.

Ninguna perturbación subjetiva, ni objetiva, intestinal, á excepción del estreñimiento. Aumento de la frecuencia del pulso. Temperatura, 37'5°.

Diagnóstico.—*Catarro gástrico* (lengua saburral, mal sabor, náuseas, distensión y dolor epigástrico, estreñimiento, etc.).

Pronóstico.—Leve.

Tratamiento.—Régimen dietético severo. Proscribir toda alimentación, al menos reducirla al uso de caldo y leche durante veinticuatro horas, y más si es preciso. Librar al estómago de su contenido al objeto de evitar que sufran fermentaciones los materiales alimenticios retenidos en dicha víscera, sin poder ser digeridos.

Para este objeto están indicados, en primer término, los eméticos, cuya acción se dirige al estómago únicamente, y después los purgantes para desembarazar todo el trayecto gastrointestinal.

Ipecacuana	1'50 gramo
Azúcar	c. s.

M. y h. s. a. papeles núm. 3. Uno cada 10 minutos con abundante cantidad de agua tibia, hasta producir la emesis.

Aparte.

Agua.	200 gramos
Citrato de magnesia	25 »
Bicarbonato sódico	1 gramo
Jarabe de cidra.	30 gramos

H. s. a. poción.

Adminístrese tres horas después de haber tomado el último papel.

Vómitos abundantes y deposiciones numerosas. El catarro gástrico terminó por resolución á los cinco días.



Polisarcia

Ignacio P..., de 35 años de edad, sin antecedentes hereditarios morbosos.

Antecedentes fisiológicos.—Trasladóse á América á la edad de veinte años, teniendo desde entonces un apetito voraz, para satisfacer al cual ingería grandes cantidades de alimentos. Al regresar á Europa, hace dos meses, perdió el apetito y la energía muscular, sobre todo en sus extremidades inferiores. Vida sedentaria.

Estado actual.—Formas redondeadas, enorme volumen, tanto de su rostro como tronco y extremidades. El cuello es corto, la región infrahióidea muy convexa hacia abajo; aberturas palpebrales pequeñas, párpados salientes, pecho y abdomen sobrecargado de gordura. Regiones glúteas muy voluminosas, etc. El color del rostro es pálido céreo. Hay aumento del número de respiraciones, ligero apagamiento del murmullo vesicular, en todo el ámbito pulmonar.

No se percibe el choque de la punta del corazón, ni se aprecia por medio de la palpación. No es posible delimitar el área pleximétrica cardíaca. Tonos cardíacos apagados. Soplo suave, presistólico en la punta. Ligero aumento de la frecuencia del pulso. Ha tenido una epistaxis.

Lengua saburral, inapetencia, mericismo, digestiones lentas. Tiene zumbidos de oído. No hay albúmina ni glucosa en la orina. No puede dedicarse á ninguna clase de trabajos, porque le sobreviene cansancio. Peso, 82 kilogramos.

Diagnóstico.—*Polisarcia*, comprobada por el exceso de pánículo adiposo.

Infiltración grasosa cardíaca por la falta de percepción del latido, tonos débiles, pulsos bajos, disnea ante la menor fatiga, etcétera. La polisarcia es de fondo anémico, como lo demuestra el color del rostro y los síntomas por parte del aparato circulatorio.

Pronóstico.—Grave.

Etiología.—Disminución de las combustiones.

Tratamiento.—Tres indicaciones: 1.^a, disminuir la producción de la grasa; 2.^a, favorecer la oxidación de la que está formada en exceso; 3.^a, excitar el sistema nervioso para aumentar las energías cardíacas.

Para lo primero: Régimen dietético riguroso. Disminución de los hidrocarbonados (pan, patatas, grasas, etc.), disminución de la cantidad de agua. Proscripción del café, elemento de ahorro que retarda las combustiones. Régimen azoado á base de carnes, basando la norma de la alimentación en el coeficiente de urea que se halle en la orina. Es preciso, sin embargo, abandonar exagerados exclusivismos: así es que permitiremos al enfermo algunas substancias feculentas, algunas verduras, etc. (acelgas, etc).

Se le sometera al uso de carnes, pescado, pequeñas cantidades de leche, vino, etc.

La segunda indicación se cumple por medio de ejercicios musculares variables: bicicleta, paseos, gimnasia, etc., masaje, hidroterapia. Por medio de la medicación: tiroidina, que da buenos resultados en los obesos de fondo anémico, cuando el coeficiente de urea no es alto; pero es preciso usarla prudencialmente, porque á veces expone al colapso. Los yoduros están igualmente indicados.

Jarabe corteza naranjas amargas. 300 gramos
Yoduro sódico. 10 »

H. s. a. poción.

Tres cucharadas al día durante las comidas.

Observaciones clínicas.—5 de Diciembre.—El análisis de la orina ha revelado la existencia de la urea en proporción normal. No hay, pues, contraindicación para el empleo de la tiroidina.

Cápsulas de tiroidina dosificadas á 0.10 gramo núm. 10.

Tres al día.

10 de Diciembre.—Mayor frecuencia respiratoria. Dolor difuso por todo el abdomen, borboríngmos y diarrea. Las deposiciones son numerosas, de consistencia semilíquida, inodoras. Temperatura normal.

Hay una *enteritis* que probablemente es debida á la acción irritante de la tiroidina sobre la mucosa intestinal. La suspendemos, lo mismo que el uso de las verduras, las que contribuirían á aumentar los trastornos intestinales.

Como los pulsos son bajos, cumpliremos la tercera indicación, aumentar las energías cardíacas.

Agua melisa	150 gramos
Licor amoniacal anisado	4 »
Benzoato cafeína	1 gramo
Jarabe de cidra	30 gramos

H. s. a. poción.

12 de Diciembre.—Sigue la debilidad de los tonos cardíacos y pulso. Hay infiltraciones sanguíneas en las escleróticas.

Agua melisa	150 gramos
Licor amoniacal anisado	2 »
Benzoato de cafeína	1 gramo
Extracto fluído hidrastis canadensis	5 gramos
Jarabe de azahar	30 »

14 de Diciembre.—Escalofríos, fiebre, disnea considerable, estertores de medianas burbujas y algunas sibilancias discretas, diseminados por ambos pulmones. *Bronquitis a frigore*, contraída probablemente al descender el enfermo de la cama y hallarse bajo la acción de corrientes de aire procedentes de las ventanas abiertas. Constituye un proceso intercurrente, que viene á agravar el pronóstico, á causa de la escasa energía contráctil del corazón.

Terapéutica.—Tónicos del corazón y expectorantes. Los anti-moniales están contraindicados por la astenia cardíaca, siendo preferibles los amoniacales, que, á la par, obrarán como estimulantes.

Agua melisa	150 gramos
Carbonato amónico	3 »
Citrato cafeína	} 1 gramo
Tintura polígala	
Jarabe de cidra	30 gramos

H. s. a. poción. Aplíquense ventosas en la cara anterior del pecho.

16 de Diciembre.—Palidez cérea. Escasa y frecuente elevación de las paredes torácicas. Debilidad de los tonos cardíacos y del pulso. Diarrea, siendo muy numerosas las deposiciones.

Es preciso combatir la diarrea, porque contribuye á la depauperación del enfermo, y porque el bajar repetidas veces de la cama para efectuar las deposiciones, podría ser motivo de nuevos enfriamientos.

Prescribióse una fórmula con creta preparada.

18 de Diciembre.—Las regiones malares ofrecen un tinte ligeramente oscuro. Labios y uñas cianóticas. Sigue la debilidad de los latidos cardíacos y del pulso. Se hacen confluentes los estertores húmedos. Tos con esputos hemoptoicos. Temperatura, 36'5°.

Terapéutica.—Estimulantes, tónicos y expectorantes.

Infusión violetas	200 gramos
Espíritu Minderero	6 »
Benzoato sódico de cafeína.	} 1 gramo
Tintura de polígala.	
Jarabe de cidra	30 gramos

H. s. a. poción.

20 de Diciembre.—Cianosis, hipotermia, colapso y muerte.

J. SOLÉ Y FORN.



Fórmulas á base de eupépticos y fermentos gastrointestinales

Fórmula núm. 1.

Polvos de nuez vómica	0'03 gramo
Papaína.	1 »
Bicarbonato sódico.	2 gramos

D. en sellos núm. 3.
Convalecencia de fiebre tifoidea.

Fórmula núm. 2.

Polvos de cuasia	0'30 gramo
Papaína.	} 1 »
Pancreatina	

D. en sellos núm. 3.
Uno antes de cada comida.

Fórmula núm. 3.

Simaruba polvo	0'40 gramo
Bicarbonato sódico.	1 »
Sacaruro canela.	1'50 »

M. y d. en pap. núm. 3.
Uno antes de cada comida.

Fórmula núm. 4.

Polvos de euasia.	0.30	gramo
Papaína.	}	1 »
Pancreatina		
Fosfato básico de cal		
Sacaruro de anís.	1.50	»

M. y d. en pap. núm. 3.

Para administrar uno antes de los alimentos

Tuberculosis pulmonar.

Fórmula núm. 5.

Maltina	}	1	gramo
Pepsina.			
Polvos colombo		0.30	»
Glicerofosfato de cal		2	gramos

M. y d. en sellos núm. 4.

Uno antes de las comidas.

Tuberculosis pulmonar.

Fórmula núm. 6.

Polvos condurango.	0.30	gramo
Pepsina.	1	»
Bicarbonato sódico.	}	1.50 »
Sacaruro de menta.		

M. y d. en pap. núm. 3.

Catarro gástrico crónico.

Fórmula núm. 7.

Gránulos de brucina dosificados á un miligramo, núm. 3

Uno antes de los alimentos.

Para tratar los síntomas, inapetencia y estreñimiento.

Fórmula núm. 8.

Polvos nuez vómica	0'05	gramo
Polvos ruibarbo	0'40	»
Pepsina.	1	»

M. y d. en sellos núm. 4.
Uno antes de las comidas.

Fórm. núm. 9

Papaína	1	gramo
Pancreatina	1'50	»
Lupulino	0'30	»
Sacaruro vainilla	2	gramos

M. y d. en tres papeles.
Adminístrese en las mismas horas que el anterior.

Fórmula núm. 10.

Acido muriático	1	gramo
Gotas amargas Beaumé.	2	
Alcohol de menta	1	gramo

Para administrar tres gotas antes de las comidas.

Fórmula núm. 11.

Agua de hinojo	150	gramos
Acido clorhídrico	6	gotas
Tintura ruibarbo	1'50	gramo
Jarabe de azahar	30	gramos

H. s. a. poción.
Catarro gástrico crónico.

Fórmula núm. 12.

Acido clorhídrico	1	gramo
Tintura nuez vómica.	2	gramos
Alcohol de menta	1	gramo

Tres gotas antes de las comidas.

Fórmula núm. 13.

Agua de hinojo 150 gramos
Tintura angustura verdadera . . . 1 gramo

Á cucharaditas antes de las comidas.
Catarro gástrico crónico.



Fórmulas á base de purgantes salinos

Fórmula núm. 1.

Agua.	200	gramos
Sulfovinato sódico	20	»
Bicarbonato sódico	}	1 gramo
Tintura anís estrellado		
Jarabe de cidra	30	gramos

H. s. a. poción.

Adminístrese á jícaras en el intervalo de una hora por la mañana en ayunas.

Fórmula núm. 2.

Agua.	300	gramos
Sulfato sódico	15	»
Bicarbonato sódico	2	»
J. achicorias.	30	»

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 3.

Agua.	200	gramos
Sulfato sódico	}	40 »
Sulfato potásico.		
Alcohol de menta	0'50	gramo
J. cidra.	30	gramos

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 4.

Ruibarbo polvo.	1 gramo
Carbonato de magnesia.	2 gramos
Sacaruro de anís	3 »

M. y d. en papeles núm. 6.

Fórmula núm. 5.

Carbonato de magnesia.	3 gramos
Bicarbonato sódico	2 »
Polvos beleño	0·10 gramo
Sac. hinojo	2 gramos

M. y d. en pap. núm. 6.

Estreñimiento y enteralgia.



Fórmulas á base de otros purgantes

Fórmula núm. 1.

Áloes	} 0'15 gramo
Extracto ruibarbo	

M. y d. en píldoras núm. 3.

Fórmula núm. 2.

Extracto belladona.	} 0'10 gramo
Polvos de belladona	
Jabón medicinal.	4 »

M. y d. en píldoras núm. 10.

Fórmula núm. 3.

Podofilino	0'05 gramo
Jabón medicinal.	0'10 »

M. y h. s. a. píldoras núm. 1.

Fórmula núm. 4.

Extracto nuez vómica.	0'05 gramo
Extracto belladona.	0'10 »
Extracto taraxacón.	0'50 »

M. y d. en píldoras núm. 8.

Fórmula núm 5.

Podofilino	0'10 gramo
Exc.	c. s.

H. s. a. pild. núm. 2.

Fórmula núm. 6.

Extracto belladona.	0'10 gramo
Evonimina.	0'40 »

M. y d. en píldoras núm 8.

Fórmula núm. 7

Calomelanos al vapor.	} 0'30 gramo
Extracto ruibarbo	

M. y d. en píldoras núm. 6. Una cada cuatro horas.
Enfermedad del hígado.

Fórmula núm. 8.

Infusión de sen	200 gramos
Manito	20 »
Jarabe achicorias comp.	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 9.

Agua toronjil.	150 gramos
Extracto belladona.	0'10 gramo
Tintura de anís	1 »
Jarabe de cidra.	30 gramos

H. s. a. poción.

Estreñimiento; enteralgia.

Fórmula núm. 10.

Agua.	200	gramos
Glicerina	30	»
Extracto belladona	0'10	gramo
J. azahar	30	gramos

H. s. a. poción.

Para el mismo enfermo que la anterior.

Fórmula núm. 11.

Agua hinojo	200	gramos
Tintura áloes comp.	}	2 »
Tintura ruibarbo		
Bicarbonato sódico		
Jarabe de naranjas amargas	30	»

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 12.

Polvos cáscara sagrada.	0'50	gramos
Sac. menta	2	»

M. y d. en pap. núm. 2.

Fórmula núm. 13.

Resina jalapa	1	gramo
Escamonea de Alepo.	0'20	»
Azúcar.	2	gramos

M. y d. en papeles núm. 3.

Insuficiencia y estrechez mitral. Pérdida de compensación.



Fórmulas á base de alcalinos y alcalinotérreos

Fórmula núm. 1.

Bicarbonato sódico	6 gramos
Azúcar	3 »

M. y d. en papeles núm. 6.

Hiperclorhidria.

Fórmula núm. 2.

Carbonato magnesia	2 gramos
Bicarbonato de sosa	} 3 »
Sacaruro de menta	

M. y d. en papeles núm. 6.

Convalecencia catarro gastrointestinal.

Fórmula núm. 3.

Papaína	1 gramo
Creta preparada	} 1'50 »
Bicarbonato de sosa	
Sacaruro hinojo	1 »

M. y d. en papeles núm. 4.

Fórmula núm. 4.

Magnesia calcinada	4 gramos
Bicarbonato sódico	8
Sacaruro cascarilla	3 »

D. en papeles núm. 8.

Hiperclorhidria.

Fórmula núm. 5.

Salicilato bismuto y cerio	}	2 gramos
Creta preparada		
Sacaruro anís	3	»

M. y d. en papeles núm. 6.

Fórmula núm. 6.

Fosfato básico de cal	}	1'50 gramo
Creta preparada		
Pancreatina		
Sacaruro hinojo		

M. y d. en cuatro papeles.

Catarro gástrico crónico.

Fórmula núm. 7.

Solución gomosa	200 gramos	
Bicarbonato sódico	2 »	
Creta preparada	}	4 gramo
Alcohol melisa		
Jarabe de cidra	30 gramos	

H. s. a. poción.

Catarro gástrico.

Fórmula núm. 8.

Solución gomosa	300 gramos
Subnitrito bismuto	3 »
Alcohol melisa	4 gramo
Jarabe de meconio	30 gramos

H. s. a. poción.

Diarrea escasa.



Fórmulas á base de antisépticos gastrointestinales

Fórmula núm. 1.

Benzonaftol.	2 gramos
Carb. magnesia	} 4 »
Sac. menta.	

M. y d. en papeles núm. 8.
Catarro gastro-intestinal agudo.

Fórmula núm. 2.

Salol.	} 2 gramos
Bicarbonato sosa	

M. y d. en 8 sellos.

Fórmula núm. 3.

Benzonaftol	} 1 gramo
Creta preparada.	

M. y d. en 6 sellos.

Fórmula núm. 4.

Salicilato bismuto	1 gramo
Carb. de cal	2 gramos
Sac. menta	3 »

M. y d. en 6 papeles.

Catarro gástrico.

Fórmula núm. 5.

Salicilato magnesio	} 2 gramos
Bicarbonato sódico	
Sacaruro hinojo	3 »

M. y d. en 6 papeles.

Fórmula núm. 6.

Agua de toronjil.	150 gramos
Resorcina	1'50 »
Alcohol anís	1 »
Jarabe culantrillo	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 7.

Cocimiento serpentaria	200 gramos
Acido cl rhídrico	0'30 gramo
Jarabe de cidra	30 gramos

H. s. a. poción.

Catarro gástrico agudo.

Fórmula núm. 8.

Agua.	200 gramos
Acido bórico	2 »
J. malvavisco	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 9.

Infusión manzanilla	500 gramos
Glicerina	40 »
Resorcina	2 »

Para enemas cortos.



Fórmulas á base de tónicos cardíacos

Fórmula núm. 1.

Polvos hojas digital	0.50 gramo
Agua hirviendo	200 gramos

I. f. y a.

Licor amoniacal anisado.	2 gramos
Tintura nuez de kola	3 »
Jarabe de canela	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 2.

Agua melisa	200 gramos
Ext. quina.	2 »
Sulfato de esparteína.	0.10 gramo
Jarabe quina.	30 gramos

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 3.

Cocimiento quina calisaya	200 gramos
Tintura nuez de kola	3 »
Jarabe de cidra	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 4.

Agua azahar	150 gramos
Tintura de convalaria mayalis.	1 gramo
Licor de Hoffman	2 gramos
Jarabe de cidra	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 5.

Agua melisa	150 gramos
Tint. adonis vernalis	1 gramo
Jarabe de cidra	30 gramos

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 6.

Ext. nuez vómica	0·10 gramo
Ext. nuez kola	0·50 »
Sulfato esparteína	0·10 »

M. y d. en pildoras núm. 10. Una cada cuatro horas.
Insuficiencia mitral.



Fórmulas á base de sudoríficos

Fórmula núm. 1.

Cocimiento altea	200 gramos
Espíritu Minderero.	3 »
Jarabe de violetas	30 »

H. s. a. poción.

Bronquitis: primer periodo.

Fórmula núm. 2.

Infusión de jaborandi	200 gramos
Acetato amónico	2 »
J. de violetas.	30 »

H. s. a. poción.

Idem que la anterior.

Fórmula núm. 3.

Infusión violetas	200 gramos
Carb. amónico	3 »
J. altea	30 »

H. s. a. poción.

Id. que las anteriores

Fórmula núm. 4.

Infusión violetas	200 gramos
Acetato amónico	3 »
Alcoholaturo acónito	1 gramo
Rob de saúco	30 gramos

H. s. a. poción.

Id. que las anteriores.

Fórmula núm. 5.

Infusión amapolas	200 gramos
Licor amoniacal anisado	3 »
J. violetas.	30 »

H. s. a. poción.

Id. que las anteriores.

Fórmula núm. 6.

Polvos de Dover	1 gramo
Azúcar	3 gramos

M. y d. en 6 papeles.



Fórmulas á base de espectorantes y balsámicos

Fórmula núm. 1.

Agua de azahar	200 gramos
Tintura convalaria mayalis.	1 gramo
» polígala	1 »
Carbonato amónico	3 gramos
Jarabe bálsamo del Tolú.	30 »

H. s. a. poción.

Fórmula núm. 2.

Solución gomosa	200 gramos
Antimonio diaforético.	} 1 gramo
Tintura polígala.	
Jarabe malvavisco.	30 gramos

H. s. a. poción.

Bronquitis aguda; segundo período.

Fórmula núm. 3.

Terpina	1 gramo
Kermes mineral	0'10 »
Sacaruro liquen.	4 gramos

D. en 10 pap.

Bronquitis aguda: segundo período.

Fórmula núm. 4.

Agua melisa	200 gramos
Tintura polígala.	1 gramo
» eucaliptus	} 2 gramos
Carbonato amónico	
Jarabe del Tolú	30 »

H. s. a. poción.

Bronquitis aguda: segundo período.

Fórmula núm. 5.

Agua.	250 gramos
Alcohol rectificado.	15 »
Tintura polígala.	1 gramo
Jarabe cidra	30 gramos

H. s. a. poción.

Pneumonía fibrinosa: período de declinación.

Fórmula núm. 6.

Monosulfuro sódico.	0.30 gramo
Polvos escila	0.15 »
» belladona	0.10 »
Goma amoníaco	0.50 »

M. y d. en píldoras núm. 8.

Bronquitis: tercer período.

Fórmula núm. 7.

Azufre dorado de antimonio	0.10 gramo
Bálsamo del Tolú	1 »

M. y d. en píldoras núm. 8.

Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 8.

Óxido blanco de antimonio	} 1 gramo
Polvos de Dower.	
Azúcar	3 gramos

M. y d. en papeles núm. 6.

Bronquitis aguda.

Fórmula núm. 9.

Bálsamo del Tolú.	}	0'50 gramo
Extracto polígala		
Extracto beleño		0'10 »

M. y d. en píldoras núm. 8.

Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 10.

Extracto nuez vómica.	}	0'10 gramo
» estramonio		
Goma amoniaco.		1 »

M. y d. en píldoras núm. 10

Estrechez é insuficiencia mitral. Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 11.

Cocimiento de altea	200 gramos
Tintura de beleño	6 gotas
» eucaliptus	2 gramos
Jarabe malvavisco.	30 »

H. s. a. poción.

Bronquitis aguda: segundo período.

Fórmula núm. 12.

Cocimiento felandrio	200 gramos
Benzoato sódico	3 »
Jarabe bálsamo del Tolú.	30 »

H. s. a. poción.

Bronquitis aguda: tercer período.

Fórmula núm. 13.

Agua toronjil.	150 gramos	
Benzoato sódico	}	2 »
Bicarbonato sódico		
Jarabe alquitrán		30 »

H. s. a. poción.

Bronquitis aguda: período de declinación.

Fórmula núm. 14.

Perlas eucaliptol núm. 8

Bronquitis crónica.

Fórmula núm. 15.

Terpina	0·40 gramo
Extracto fluido de eucaliptus	0·20 »

M. y d. en 4 pildoras.

Bronquitis aguda: tercer periodo.

