en laderas de tesos soleados y con escasa vegetación, *X. Giráldez*, 10-V-1981, SALA 29680; ibídem, 17-III-1983, *X. Giráldez*, SALA 29688.

Con estas dos nuevas aportaciones correspondientes a las provincias de Zamora y Valladolid, en las que no había sido señalada con anterioridad, tratamos de ir completando el área de distribución de este taxon para la zona centro, de donde ya había sido citada: de Ávila por PAU *(Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.* 1: 49, 1902), de Soria por P. MONTSERRAT *(Collect. Bot.* 2, 2: 261-271, 1948) y de Salamanca por E. RICO *(Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 248, 1979), aunque en estos casos no se identificaba a nivel subespecífico, ya que en este rango fue propuesto posteriormente por MOLERO *(Collect. Bot.* 14: 347-374, 1983).

Dado que en los últimos años está siendo encontrada en muchas provincias en las que se había herborizado de forma minuciosa, parece lógico pensar que la falta de citas anteriores se debe sobre todo al pequeño tamaño de esta planta y a su fenología —su ciclo vital se desarrolla a comienzos de la primavera— más que a la escasez o ausencia de la misma.

Ximena GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ & Francisco Javier FERNÁNDEZ DÍEZ, Departamento de Botánica, Facultad de Biología. Salamanca.

SOBRE EL ÁREA DE DISPERSIÓN DE *ARTEMISIA TOURNEFORTIANA* REICHENB. EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Al consultar los pliegos de *Artemisia* L. contenidos en el Herbario BCF, con motivo de la revisión de dicho género en la Península Ibérica, que estamos realizando como tesis doctoral, hemos hallado dos de ellos (BCF n.º 7473 y n.º 7475) recolectados por don *Salvador Rivas Goday*, el 17 de septiembre de 1948, en Titulcia (MADRID) y determinados como *Artemisia variabilis* Ten.

Estudiadas las muestras, se han redeterminado como *Artemisia tournefortiana* Reichenb.

Esta especie, originaria de Rusia meridional, ya había sido reseñada como adventicia en Portugal (LAWALRÉE, *Agron. Lusit.* 18: 92-93, 1956; RAINHA *in* PINTO DA SILVA & *al.*, *Agron Lusit.* 20, 3: 245, 1959). El primer autor la señala en Fratel, Golegã pr. Azinhaga y Abrantes, y el segundo, de Portas de Ródão y Constância; de esta última localidad, hemos podido ver un pliego, depositado en el Herbario G.



Artemisia tournefortiana Reichenb.
● Localidades conocidas.
★ Nuevas citas.

Recientemente (NAVARRO & SÁNCHEZ, *Studia Bot.*, 1: 27-31, 1982) ha sido detectada la presencia de este taxon en España, concretamente en la provincia de ZAMORA (Pereruela, Salto del Ladrón).

La correcta determinación de los pliegos a que al principio aludíamos supone, pues, la segunda cita de *A. tournefortiana* Reichenb. en España, y creemos que está lo bastante alejada de la primera para que su publicación tenga cierto interés corológico. Por otra parte, cabe tener en cuenta que se trata de los ejemplares de la especie considerada recogidos en primer lugar en la Península Ibérica, anteriores a la primera cita en Portugal, que se basa en plantas recolectadas en 1952, 1955 y 1958, y todavía más, a la primera en España, que lo hace en ejemplares cogidos en 1979.

Podemos, todavía, complementar esta cita con otra, de localidad cercana (Talavera de la Reina, 7-X-1979, leg. A. *Segura Zubizarreta*, det. J. Vallès, Herb. Segura n.º 18674), cuyo pliego hemos visto más tarde y que aumenta el área de la especie en la zona central de la Península.

Naturalmente, cabe esperar que vayan apareciendo nuevas localidades peninsulares del neófito que nos ocupa, ya sea en recolecciones, ya en revisiones de material de herbario.

Joan VALLÈS I XIRAU, Departament de Botànica, Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona

ERAGROSTIS CURVULA (SCHRADER) NEES: UNA NUEVA GRAMÍNEA PARA LA FLORA ESPAÑOLA

Eragrostis curvula (Schrader) Nees, Fl. Afr. austral. ill.: 397 (1841).
Syn. *E. filiformis* Nees in Linnaea 7: 330 (1832), non Link, Hort. berol. 1: 191 (1827).

MADRID: carretera de Villaviciosa de Odón a Chapinería, pr. Brunete, 30TVK17, cunetas, 9-XII-1982, *A. Barra & J. Guillén*, n.º 2251 AB

Se trata de una especie sudafricana cuya difusión, al parecer, tiene relación con la industria de la lana (cf. THELUNG, *Mém. Soc. Natl. Sci. Nat. Math. Cherbourg* 38: 118, 1912; RYVES, *Watsonia* 13: 116. 1980), aunque en otros países se ha cultivado como ornamental (cf. HITCHCOCK, *Man. Grasses U.S.* 168, 1935). Su presencia en España no es reciente, pues ya fue herborizada en los años cincuenta también en la provincia de Madrid (parcelas del Monte de El Pardo, 15-VII-1958, *A. Rodríguez*, MA 201978); este dato, unido a que la planta se desarrolla con éxito en la localidad que damos a conocer, hace pensar que está naturalizada, aunque tal cosa es siempre difícil de asegurar.

Se ha señalado, como adventicia, en el sur de Francia (THELUNG, *l. c.*; KERGUÉLEN, *Lejeunia* 110: 50, 1983) e Islas Británicas (RYVES, *l. c.*), pero no en Italia (cf. RICCERI, *Webbia* 35: 323-354, 1982) ni, que sepamos, en la Península Ibérica.

Gonzalo NIETO FELINER, Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid.

NOTAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE TRES HIDRÓFITOS EN EL INTERIOR PENINSULAR

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.

TOLEDO: Lillo, lagunas del Altillo, cultivada en el Jardín Botánico de Madrid, 24-I-1985, *S. Cirujano*, MAC 12651.