

L'hàbitat d'elecció de *Crassula campestris* en aquestes localitats és l'espai de transició entre la roca nua i els pradells d'annuals silíceoles. A l'orla de sauló gruixut, grava o petits còdols que es troba immediatament al costat de la roca, forma petites poblacions pures (25-100 cm²) o, més sovint, apareix acompanyada de *Sedum caespitosum* (Cav.) DC., planta molt més freqüent a l'àrea. Ambdues semblen perfectament adaptades a suportar la sequedat i l'extrema precarietat del sòl que caracteritzen aquest ambient. Quan hi ha una mica més de terra sorrenca i, per tant, l'aigua pot ésser retinguda amb més eficàcia, apareixen altres espècies al costat d'aquelles dues, constituint un conjunt més ric, catalogable dins l'aliança *Tuberarion guttatae*.

Bunium bulbocastanum L.

És una umbel·lífera estesa per bona part d'Europa però que no ha estat citada amb certesa del nostre país. SILVESTRE (*Lagascalia*, 3(1): 39, 1973) exclou *B. bulbocastanum* de la flora peninsular, en considerar que totes les plantes determinades sota aquest nom, tant a la Península com a les Balears, pertanyen a *B. alpinum* Waldst. & Kit. subsp. *macuca* (Boiss.) P. W. Ball. Nosaltres hem observat la presència regular d'un conducte oleífer als espais intercostals del mericarp, la qual cosa ens permet separar les nostres plantes del *B. alpinum*.

Hem trobat aquesta espècie a l'obaga de la Serra de Rodes, per damunt dels 500 m d'altitud, fins a la carena, a 670 m. Les localitats corresponen al quadrat UTM 31T EG 18 (BC 647945; BC 647952). Cal fer notar que no es troba en camps de conreu, com en altres indrets, sinó en pendissos poc o molt pedregosos, que probablement no foren mai conreats, en els quals prosperen plantes de certa tendència montana.

Lotus conimbricensis Brot.

Als Països Catalans aquesta espècie és coneguda només del Rosselló, on és molt rara (O. DE BOLÒS & J. VIGO, Fl. Països Catalans, 1984). L'hem recol·lectada a la península del Cap de Creus, en un fonsal prop del Coll de la Perafit, EG 18, 230 m, (BC 647949), on es trobava en pradells d'annuals silíceoles.

Medicago murex Willd. subsp. murex

És una planta mediterrània que O. DE BOLÒS & J. VIGO (l.c.) esmenten d'un únic indret dels Països Catalans, el delta del riu Tordera. CASELLAS (*Collect. Bot* 4: 242 s, 1962) és qui dona aquesta citació, alhora que suggereix la possibilitat que es trobi en d'altres punts de la costa de Girona. Recull també les citacions de BUBANI (*Fl. pyrenaea*, vol. II: 480, 1899), qui l'esmenta "prop Sant Feliu de Guixols ad Sant Pol". En donem ara noves localitats, totes elles a la península del Cap de Creus (Alt Empordà): fossar de la Ciutadella de Roses, a la llera humida, EG 17, 10 m, (BC 647951); sota el Coll de la Perafit, en pastures, EG 18, 230 m, (BC 647948); al camí de Mas Duran (Cadaqués), en olivets abandonats, EG 28, 90 m, (BC 647950).

Teresa FRANQUESA I CODINACH. Berenguer de Palou 135, àtic 2. 08027-Barcelona

Hypericum nummularium L.

Hem trobat aquesta planta sobre Àlors d'Isil, 1400 m, a la Vall d'Àneu, 31T CH 43. Creix a les esquerdes i al repeu d'unes roques calcínals en exposició nord juntament amb *Asperula hirta* i *Ranunculus thora*.

Hypericum nummularium és relativament freqüent als Pirineus centrals i arribava cap a l'est fins al sector occidental de la Vall d'Aran. Era conegut del Port de Benasc (ZETTERSTEDT, Pl. vasc. Pyrénées princip., 1856) i del Port de la Picada (GRENIER, M. & GODRON, M. Flore de France, 1848): de la baixa Vall d'Aran, ja en territori francès —Pic de Rie, Pic de Gar, Le Cagire— (COSTE & SOULIÉ, Florule du Val d'Aran, 1913) i de l'Artiga de Viella (LENNAS, M. Contrib. est. fl. Pirineo Central, Valle de Arán, 1912).

Amparo CARRILLO. Departament de Botànica. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona