

NOTES FLORÍSTIQUES, V

37. *Rumex patientia* L. Aquesta espècie, antigament cultivada com a verdura, havia desaparegut d'una manera gairebé completa durant els darrers temps. Actualment, però, n'hi ha una gran població, densa i exuberant, a Barberà del Vallès, prop de la sortida de Bellaterra de l'autostrada Barcelona-Terrassa (DF 29). Es fa sobre sòls profunds i fèrtils, entremig de camps de conreu, en un ambient caracteritzat pel predomini de bosquets d'*Ulmus minor*.

38. *Rumex palustris* Sm. En preparar el gènere *Rumex* per a la "Flora dels Països Catalans" no en vàrem trobar cap testimoni autèntic ni cap referència digna de confiança. Per això el vàrem excloure i només li vàrem dedicar una curta nota (vol. II: 611) entre les espècies no admeses.

Això no obstant, MATEO i FIGUEROLA (Fl. anal. prov. Valencia: 238, 1987) indiquen la seva presència a les marjals del territori mediovalentí i M. B. CRESPO assenyala, concretament, que es fa als canyers de les rodalies de Sagunt (YJ 39).

Darrerament l'hem observat, així mateix, en els herbassars higronitròfils de la riba del Segre, prop de Seròs (BF 89). L'aspecte recorda el de *R. obtusifolius*, però la planta és anual o biennal i té les fulles estretament oblongo-lanceolades.

39. *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees al riberal del Segre. Aquesta gramínia, que prové de l'Àfrica del Sud i ha estat introduïda a les autostrades, actualment es troba en curs d'expansió ràpida. La primera citació és de T. CASASAYAS i A. FARRÀS (Collect. Bot. 16: 162-164, 1985). A hores d'ara la seva presència ja és coneguda en una extensa àrea que va de les valls dels Pirineus i de l'Alt Empordà al Baix Llobregat i al Baix Cinca.

A Seròs (BF 89), les seves grans motes, denses i de contorn circular, envaeixen les plantacions de pollancre (*Populus canadensis*) i en alguns llocs formen un estrat herbaci poc continu que, al temps de la florida (maig), assoleix 60-70 cm d'alçada.

ORIOI DE BOLÒS. Departament de Biologia Vegetal. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. 08028 Barcelona.

DE VEGETATIONE NOTULAE, V

Les notes precedents han estat publicades a *Collectanea Botanica* (Barcelona). I: vol. IV(2): 253-286, 1954; II: vol. V(1): 195-268, 1956; III: vol. XII: 63-76, 1981; IV: vol. XV: 101-107, 1984.

45. *Asplenio (onopteridis)-Quercetum ilicis* (= *Quercetum mediterraneo-montanum*) Br.-Bl. 1936 em. nom. Rivas Mart. subass. *hylocomio (splendentis)-buxetosum (sempervirentis)*.— Procedència dels inventaris:

- 1 (8859). La Garrotxa: Beget, damunt el poble, vessant esquerre de la vall. Inventari tipus de la subassociació.
- 2 (8860). Prop del precedent.
- 3 (6112). Osona: Torelló, les Cases (carretera de la Vola); roca calcària margosa. Obac no afectat per la inversió tèrmica de la Plana de Vic.
- 4 (6013). La Garrotxa: Oix, les Valls, part baixa; roca calcària.
- 5 (8858). La Garrotxa: Beget, carretera de Camp-rodon, començament del camí del Pont de les Arçoles (Pont de la Qüestió).