

○ PROVES MÈDIQUES DIAGNÒSTIQUES



Per a obtenir el diagnòstic cal fer-se unes proves específiques.

Generalment consten de:

Analítica de sang



i/o

Presa d'una mostra de secrecions genitals (d'uretra, vagina, coll uterí...)

i/o

Presa d'una mostra d'orina

+

Exploració física

Aquestes proves han de ser realitzades per metges en centres mèdics com hospitals, CAPS o altres centres especialitzats.



○ ON PUC ADREÇAR-ME?



Sanitat Respon
Tel. 902 111 444

Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona (CJAS)
Tel. 934151000
www.centrejove.org

CatSalut Respon
Tel. 061

Programa per a Prevenció i Assistència de la SIDA
Tel. 900 212 222
www.gencat.net

Presencialment:

Unitats de Malalties de Transmissió Sexual de Barcelona, Tarragona o Girona
Serveis Territorials de Salut a Lleida

Professionals de la salut: **Metges/ses, infermers/es, farmacèutics/es !!!**


○ I RECORDA...

**Millor PREVENIR
que CURAR!**

Fes ús del preservatiu



Malalties de Transmissió Sexual



QUÈ SÓN?

Són un **grup de malalties** infeccioses que **es transmeten durant les relacions sexuals** amb una persona infectada.

La **vagina, el penis, l'anus i la boca** són els llocs més freqüents on podem localitzar microorganismes com **virus, bacteris, fongs o paràsits**, responsables de produir una MTS.

○ ELS SÍMPTOMES DE LES MTS

SÓN MOLT DIVERSOS I PODEN FINS I TOT MANIFESTAR-SE FORA DELS ÒRGANS GENITALS I URINARIS.

TAMBÉ PODEN NO DONAR CAP SÍMPTOMA VISIBLE

○ QUÈ ENS PASSA?

MALALTIA		
		
Gonocòccia o Gonorrea	-Secreció purulenta de color groguenc del penis o l'anus -Coïssor al orinar	-Augment lleu del flux vaginal -Coïssor al conducte urinari -Alteracions menstruals -Dolor abdominal o cansament
Sífilis	-Xancre: ulceració vermella en el lloc de contacte (genitals, boca o anus) -Lesions a la pell dels genitals -Secrecions diferents a les habituals i/o molèsties genitals com: picor, coïssor o dolor	

MALALTIA		
		
Clamídia	-Secreció del penis -Necessitat d'orinar, i de vegades, dolor -Pot no presentar símptomes	-Secreció vaginal més abundant o diferent de la normal. -Dolor abdominal -Pot no presentar símptomes
Herpes genital	1r/ Petites vesícules als genitals 2n/ Ulceració de les vesícules 3r/ Cicatrització de les úlceres (15-20 dies) *La desaparició de lesions no significa guariment de la malaltia!	
VPH (Condilomes)	"Lesions visibles": Berrugues o condilomes en forma de cresta de gall o planes "Lesions invisibles": Al coll de l'úter en dones i al penis en homes. Sense símptomes. Només detectables amb proves específiques.	

MALALTIA		
		
VHB (Virus de la hepatitis B)	-Generalment asimptomàtic. -En ocasions: -Coloració groguenca de la pell -Febre -Vòmits -Orina fosca -Femtes blanquinoses * Altres hepatitis com la A, C, D i E també poden ser transmeses per contacte sexual.	
VIH (SIDA)	-A l'inici (VHI): febre, inflamació dels ganglis, erupció cutània -Pot ser asimptomàtica mentre el virus està latent. -Afecta al sistema immunitari. Augmenta la susceptibilitat de contraure malalties.	
Pediculosis púbica (polls)	-Picor intensa al pubis -Irritació i inflamació a la regió púbica o axil·les -Petites taques de sang a la roba (de les picades) -Visualització dels polls a la zona púbica, pestanyes...	