

Glyceria declinata Bréb.

Alt Empordà: Les Salines, Agullana, sobre Sta. Eugènia, 400 m 31T DG 89, al *Glycerio-Sparganion*, J. Bou i R. M. Manobens, 23-VI-1984, BC 649.115.

Alta Ribagorça: Vall de Boí, Pla de la Cabana, camí dels Estanys Gémena, 1960 m 31Y CH 21, al *Caricetum nigrae*, A. Carrillo i J. Ninot, 19-VIII-1978. BCC.

Glyceria declinata Bréb. és una espècie propera a *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. i a *Glyceria plicata* Fries, però fàcilment reconeixedora tant pel seu port, més petit, com pel detall de les seves flors, que tenen la glumel·la inferior amb tres dents molt marcades y la glumel·la superior bífida amb dues puntes força llargues.

Aquest tàxon de distribució subatlàntica és conegut de força indrets de la Península Ibèrica (STORMER, M. *Glyceria declinata* Bréb. *Blyttia*, 5: 1-15, 1951) on apareix a les comunitats del *Glycerio-Sparganion* (DÍAZ, T. E. y PENAS, A. *Studia Botanica*, 3: 247-254, 1984), i sembla, en canvi, desconegut de les terres catalanes. Nosaltres l'hem trobat al Pla de la Cabana (Vall de Boí), en unes molles del *Caricetum nigrae* una mica ruderalitzades. L'elevada altitud de l'indret on es trobava la planta, 1960 m, justifica la seva aparició en comunitats del *Caricion nigrae* i no del *Glycerio-Sparganion*. D'altra banda a l'Europa central es fa en comunitats humides però ruderalitzades: *Agropyro-Rumicion*, *Polygonion avicularis*,... així com també en comunitats del *Nanocyperion* (OBERDORFER, E. *Pflanzensoziologische Exkursionsflora*, 1979). Hem trobat també aquesta planta a les muntanyes de Les Salines (Alt Empordà) prop d'Agullana. En aquest indret vivia a 400 m d'altitud, en uns mulladius del *Glycerio-Sparganion*, comportament que s'adiu més amb el que té a la resta de la Península Ibèrica.

Josep BOU. Institut Botànic de Barcelona.

Amparo CARRILLO. Departament de Botànica. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

Addicions a la flora del massís del Port del Comte (Pirineus Orientals)

En el decurs de l'exploració florística del massís del Port del Comte hem trobat alguns tàxons no indicats prèviament i que presenten un cert interès corològic.

Cada localitat va acompanyada de la quadrícula UTM d'1 km (zona 31 T) i els plecs testimoni es troben a l'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona (BC).

Aconitum lamarckii Rchb.— Alt Urgell: Prat d'Arderic, 2150 m, CG 7872.

Alchemilla plicatula Gand.— Solsonès: obaga de Suana, 1900 m, CG 7970.

Astragalus purpureus Lam.— Solsonès: obaga de Suana, 1850 m, CG 7970.

Cotoneaster integerrimus Medicus— Alt Urgell: Prat Llong, 1900 m, CG 7672.

Festuca airoides Lam.— Alt Urgell: obaga de la Tossa Pelada, 2300 m, CG 7772.

Medicago suffruticosa Ram. ex DC. subsp. *suffruticosa*— Alt Urgell: Prat Llong, 1900 m, CG 7672.

Pedicularis pyrenaica Gay— Alt Urgell: sobre el Prat d'Arderic, 2100 m, CG 7872.

Polygonatum verticillatum (L.) All.— Solsonès: obaga de Suana, 1800 m, CG 7970.