PALEONTOLOGÍA >

Sesenta huesos y un millón de años: hallado en Murcia el esqueleto más antiguo de un lince ibérico

El ejemplar murió atrapado en una gruta kárstica y ha sido encontrado en una vieja cantera abandonada

ESCUCHAR EL ARTÍCULO | 4 min.





Recreación paleoartística de la antigua cavidad de Quibas, con un lince ibérico atrapado en su interior hace un millón de años.
NÙRIA MALO



VICENTE G. OLAYA
Madrid - 13 NOV 2026 - 05:30 CET

4 Añadir EL PAÍS en Google

El lince ibérico (*Lynx pardinus*) es uno de los carnívoros más característicos de la península Ibérica. Su origen arranca en el momento en que las poblaciones ibéricas de *Lynx issiodorensis*, una especie ampliamente distribuida por Europa durante el Plioceno (de 5 a 2,5 millones de años), comienzan a diferenciarse. En la península, este proceso se produjo a causa de las fuertes fluctuaciones climáticas del inicio del Pleistoceno (2,5 millones de años), cuando la alternancia de fases glaciares e interglaciares favoreció la fragmentación de hábitats y el aislamiento de algunas poblaciones. La estructura ósea de uno de estos ejemplares ha sido hallada ahora en el yacimiento de Quibas (Abanilla, Murcia), convirtiéndose en "el esqueleto más antiguo documentado para la especie", explican sus descubridores.

MÁS INFORMACIÓN



Linces contra milanos: el felino caza al otro depredador con el que compite por los conejos en Doñana

NEWSLETTER

Apúntate al boletín de Materia, con el mejor análisis de la actualidad científica

mrasm74@gmail.com

APUNTARME

Aunque el lince ibérico es relativamente abundante en yacimientos paleolíticos peninsulares, los restos correspondientes a sus poblaciones más antiguas son escasos y, en

muchos casos, muy fragmentados, se lee en el estudio *Un hallazgo singular en Quibas (Abanilla, Murcia). El esqueleto más antiguo de Lynx pardinus*, de Pedro Piñero, Saverio Bartolini Lucenti, Montserrat Ras Mallorquí, Jordi Agustí i Ballester, de las universidades de Valencia, Florencia y Barcelona.

Sin embargo, la pieza más antigua recuperada de un *Lynx pardinus* procede de Avenc Marcel (Barcelona), donde se recuperó un cráneo datado en torno a 1,6 millones de años, a los que se suman otros fragmentos del animal en Venta Micena (Granada), Fuente Nueva 3 (Granada) o Vallparadís Estació (Barcelona), entre otros.

ÚLTIMAS NOTICIAS

10:08 **David Broncano y 'La revuelta' responden a la denuncia de Vox: "No vamos a subir lo que quedo fuera. No vamos a concederles más"**

09:57 **Jordi Clos, un insólito escriba en la estela de Mika Waltari y Christian Jacq**

09:36 **Un extrabajador de la cantera del balasto de Adamuz da pistas a la jueza sobre material "defectuoso" en el punto del siniestro**

09:31 **Desestimada la demanda contra Selena Gomez interpuesta por los inversores de Wondermind, su empresa de salud mental**


ESPECIAL PUBLICIDAD



Un día para descubrir el Madrid real (y varios más para explorar otros Reales Sitios)

LO MÁS VISTO

1. Un estudio destapa nueve muertes por el uso de Nolotil en dos años en Alicante, siete de ellas de pacientes británicos
2. Yolanda Díaz retira su candidatura a la dirección general de la OIT
3. Penélope Cruz, Charlize Theron, Florence Pugh: los 25 mejores looks de los Governors Awards
4. Renfe investiga a un maquinista que reanudó la



Restos del esqueleto de lince de Quibas, junto con la reconstrucción esquelética y la reconstrucción en vida del animal.
MARÍA D. GUILLÉN / IPHES-CERCA / MONTSERRAT RAS MALLORQUÍ

Pero ahora, en el yacimiento de Quibas, una vieja cantera abandonada, se ha recuperado con una datación de un millón de años un esqueleto parcial formado por 60 piezas pertenecientes a un mismo individuo. Su recuperación se llevó a cabo en dos fases. Durante la campaña de excavación de 2021 se extrajeron las primeras 30 piezas. En 2024 se retomaron los trabajos, recuperándose el resto del

marcha de un tren abarrotado: “Recemos para que no pase nada”

5. Ángel Gaitán, el mecánico más famoso de España, entrevista a Abascal tras el plantón a Jordi Wild: “Tienes mi voto”

esqueleto conservado, incluyendo elementos craneales. “Aunque los restos de Quibas no representan la presencia más antigua conocida de *Lynx pardinus*, el material recuperado constituye hasta el momento el esqueleto más antiguo documentado para la especie”, indican los expertos.

Las piezas incluyen fragmentos del cráneo, elementos dentales, costillas, vértebras y numerosos huesos correspondientes tanto a las extremidades anteriores como a las posteriores, lo que “convierte al ejemplar de Quibas en el registro más completo de *Lynx pardinus* para el Pleistoceno Inferior”.

Hace un millón de años, lo que ahora es el término municipal de Abanilla era “un entorno forestal en mosaico, con una presencia significativa de espacios abiertos”. La combinación de áreas boscosas o de bosque abierto, matorrales, zonas rocosas y espacios herbáceos encaja bien con la presencia de *Lynx pardinus,* un depredador de acecho que requiere cobertura vegetal, pero también áreas abiertas donde localizar y capturar sus presas.





Proceso de elaboración de las réplicas del esqueleto del lince de Quibas.
D'ART FACTORY

El estudio explica, además, que "el carácter kárstico del yacimiento permite plantear que Quibas funcionó como una trampa natural para algunos vertebrados de mayor tamaño. A través de aperturas al exterior, distintos animales pudieron caer accidentalmente a la cavidad y quedar atrapados. En el caso del lince, la concentración de los elementos en un único cúmulo, junto con la presencia de algunos restos en conexión anatómica, resulta compatible con una caída accidental al interior de la cavidad, más que con una acumulación secundaria o retrabajada".

Junto al lince también se han recuperado elementos óseos de *Felis silvestris* (gato montés), *Vulpes alopecoides* (zorro), *Canis mosbachensis* (perro), *Meles meles* (tejón). "Esta asociación muestra que el lince ibérico formaba parte de una comunidad de depredadores diversa, en la que coexistían formas de distinto tamaño y con requerimientos ecológicos diferentes", dice el estudio.

Los resultados preliminares dan para el lince hallado unas dimensiones ligeramente superiores a las de los ibéricos actuales. El análisis morfométrico sugiere que, además de conejos, consumía presas de talla media, como individuos juveniles de caprinos o cérvidos. Los linces poblaron Murcia desde finales del Pleistoceno inferior hasta el siglo XX.

Los huesos del ejemplar han sido reproducidos por los técnicos para "trasladar la relevancia científica del hallazgo al ámbito social y educativo, contribuyendo a la divulgación, conservación y puesta en valor del patrimonio paleontológico de la Región de Murcia", termina el informe.

SOBRE LA FIRMA



Vicente G. Olaya

VER BIOGRAFÍA

Recibe el boletín de Ciencia

COMENTARIOS - 4

Normas ›

MÁS INFORMACIÓN

Retirados por irregularidades seis estudios de Daniel Balsalobre, el científico emergente 'número 1' en

España

MANUEL ANSEDE

Los grandes carnívoros que más matan no son los que creemos

JAVIER YANES

ARCHIVADO EN

Ciencia · Paleontología · Murcia · Abanilla · Hallazgos arqueológicos ·

Se adhiere a los criterios de

Más información ›

Si está interesado en licenciar este contenido, pinche **aquí**

Descuentos Escaparate **BLACK FRIDAY ANTICIPADO** Cursos Cursos online Idiomas online EL PAÍS Vinos

Zuecos forrados Crocs unisex. COMPRA POR 35,99€ (40% de descuento)

Eau de toilette unisex CALVIN KLEIN CK ONE. COMPRA POR 26,54€ (25% de descuento)

Batería externa Anker Power bank 20.000 mAh 87 W con cable USB C integrado. COMPRA POR 35,99€ (28% de descuento)

Pack de 2 enjuagues bucales de Listerine. COMPRA POR 8,98€ (40% de descuento)