


Diferencias en la severidad y manejo de la Fibromialgia en función de la intensidad del dolor y la ira

Ruiz, J. *, Fusté, A. *, Cros, N. *, Rojals, R. *, Casas, N. *, García, M. * y Vacas, M. **

* Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia – Universitat de Barcelona

** Consorci Sanitari Integral – Hospital de Sant Joan Despí *Moisés Broggi*



Objetivos



Comprobar si la mayor intensidad de dolor e ira en mujeres diagnosticadas de Fibromialgia (FM) las diferencia significativamente en variables clínicas y de afrontamiento.

Método (1)


Muestra Mujeres diagnosticadas de FM

N = 83 (Edad media = 56,4 ± 9,2 años)



Procedimiento

Grupos de Dolor (MPQ-SV): Análisis de Conglomerados jerárquico


Grupos de Ira (STAXI-2): Bajos= Rasgo ≤ Pc25; Altos= Rasgo ≥ Pc75



■ Bajo Dolor ■ Alto Dolor




■ Baja Ira ■ Alta Ira



Método (2)

Medidas psicológicas



Análisis de datos

- ✓ Análisis de Conglomerado jerárquico (*método Ward*)
- ✓ Contraste de medias (*t de Student*)
- ✓ Magnitud de las diferencias (*g de Hedges*)
- ✓ Análisis Discriminante (*método Wilks*)

Resultados


Magnitud de las diferencias

(g de Hedges)

$g \geq 0,80$ Elevada

$0,50 \leq g \leq 0,79$ Moderada

$0,20 \leq g \leq 0,49$ Baja



Conclusiones

1

DIFERENCIAS CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVAS

La severidad de la FM y la disfuncionalidad de su afrontamiento se agrava tanto más cuanto mayor es la intensidad del dolor y la ira

2

DIFERENCIAS en *Intensidad del Dolor*

La Intensidad del Dolor es discriminada conjuntamente ($r_c = ,65$; $\lambda = ,58$; $p < ,001$) por el grado de '*Catastrofismo*' (*c. std* = ,77) y la '*Severidad*' de la FM (*c. std* = ,56)

Clasifican correctamente el 80% de los casos

3

DIFERENCIAS en *Rasgo de Ira*

El Rasgo de Ira es discriminado por el grado de '*Depresión*'
($r_c = ,59$; $\lambda = ,65$; $p < ,001$)

Clasifica correctamente el 73,8% de los casos