

# Recomendaciones generales para la carga inmediata de implantología bucal

Micó-Llorens, José María\*  
Sánchez-Garcés, M<sup>a</sup> Ángeles  
Pi-Urgell, Juan  
Gay-Escoda, Cosme

Máster de Cirugía e  
Implantología Bucal. Facultad de  
Odontología. Universidad de  
Barcelona  
jmmico@hotmail.com

**E**n implantología se acepta un periodo de curación de 3 a 6 meses desde que se colocan las fijaciones, para permitir la oseointegración. Sin embargo, el afán por acortar el tiempo de tratamiento hace que se revisen constantemente estos periodos de curación, sin reducir el porcentaje de éxito de los implantes. La carga inmediata consistiría en llevar esta idea al extremo, ya que se colocaría la prótesis en un plazo mínimo después de la inserción de los implantes. Se ha realizado una revisión en Medline de la literatura publicada a este respecto en los últimos 10 años. Definiremos los tipos y sistemas de implantes en los que se ha ensayado esta técnica así como los diferentes protocolos de carga. Se razonarán las recomendaciones anatómicas que debe cumplir el paciente y los aspectos más importantes tanto en la fase quirúrgica como en la confección de la prótesis. Según los estudios actuales la carga inmediata no puede considerarse un tratamiento de elección para la mayoría de nuestros pacientes, aunque puede ser viable en casos seleccionados. Por último, se presentarán dos casos a modo ilustrativo.