



Fe de errores

Fe de errores de «Recomendaciones para el trasplante renal de donante vivo»

Erratum to “Recommendations for living donor kidney transplantation”

Miguel Ángel Frutos^{a,*}, Marta Crespo^{b,1}, María de la Oliva Valentín^{c,1}, Ángel Alonso-Melgar^d, Juana Alonso^a, Constantino Fernández^e, Gorka García-Erauzkin^f, Esther González^g, Ana M. González-Rinne^h, Lluís Guiradoⁱ, Alex Gutiérrez-Dalmau^j, Jorge Huguet^k, José Luis López del Moral^l, Mireia Musquera^m, David Paredesⁿ, Dolores Redondo^b, Ignacio Revuelta^o, Carlos J. Van-der Hofstadt^p, Antonio Alcaraz^m, Ángel Alonso-Hernández^e, Manuel Alonso^q, Purificación Bernabeu^p, Gabriel Bernal^r, Alberto Breda^k, Mercedes Cabello^a, José Luis Caro-Oleas^s, Joan Cid^t, Fritz Diekmann^o, Laura Espinosa^d, Carme Facundoⁱ, Marta García^c, Salvador Gil-Vernet^u, Miquel Lozano^t, Beatriz Mahillo^c, María José Martínez^v, Blanca Miranda^w, Federico Oppenheimer^o, Eduard Palou^s, María José Pérez-Saez^b, Lluís Peri^m, Oscar Rodríguez^k, Carlos Santiago^x, Guadalupe Tabernero^y, Domingo Hernández^a y Beatriz Domínguez-Gil^c Julio Pascual^b

^a Servicio de Nefrología, Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España

^b Servicio de Nefrología, Hospital del Mar, Barcelona, España

^c Organización Nacional de Trasplantes, Madrid, España

^d Servicio de Nefrología Pediátrica, Hospital La Paz, Madrid, España

^e Servicio de Nefrología, Hospital Universitario A Coruña, A Coruña, España

^f Servicio de Nefrología, Hospital Universitario de Cruces, Bilbao, España

^g Servicio de Nefrología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

^h Servicio de Nefrología, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, España

ⁱ Servicio de Nefrología, Fundació Puigvert, Barcelona, España

^j Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

^k Equipo quirúrgico de Trasplante Renal, Fundació Puigvert, Barcelona, España

^l Magistrado Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Cantabria, España

^m Servicio de Urología, Hospital Clínic Universitari, Barcelona, España

ⁿ Sección de Donación y Coordinación de Trasplantes, Hospital Clínic Universitari, Barcelona, España

^o Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital Clínic Universitari, Barcelona, España

^p Unidad de Psicología Hospitalaria, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España

^q Coordinación Autonómica de Trasplantes, Sevilla, España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: miguel.frutos@gmail.com (M.Á. Frutos).

¹ MAF, MC y MOV comparten la primera posición de autoría.

<https://doi.org/10.1016/j.nefro.2023.01.012>

0211-6995/© 2023 Sociedad Española de Nefrología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

^r Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

^s Servicio de Inmunología, Hospital Clínic i Universitari, Barcelona, España

^t Unidad de Aféresis y Terapia Celular, Servicio de Hemoterapia y Hemostasia, Hospital Clínic Universitari, Barcelona, España

^u Servicio de Nefrología, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

^v Servicio de Urología Pediátrica, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

^w Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, Madrid, España

^x Servicio de Nefrología, Hospital General de Alicante, Alicante, España

^y Servicio de Nefrología, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

En el suplemento «RECOMENDACIONES PARA EL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO» (Nefrologia 2022;42(S2):1-128) se han detectado los siguientes errores:

- En el artículo «Trasplante renal de donante vivo: Guía con evidencias actualizadas» (doi: 10.1016/j.nefro.2022.01.007):

Se sustituye el siguiente párrafo:

1. En el clipaje de la arteria renal del donante es recomendable, por mayor seguridad, el uso de doble hem-o-loks aplicados con una separación de 2 mm y a la misma distancia también del borde de sección (17).

por este otro:

En el clipaje de la arteria renal del donante no es recomendable el uso de hem-o-lok por el fallecimiento de algún donante de forma excepcional tras hemorragia (17).

2. Cita bibliográfica número 17: se sustituye por la siguiente:

S Janki, D Verver, KWJ Klop et al. Vascular management during live donor nephrectomy: an online survey among transplant surgeons. Am J Transplant. 2015;15(6):1701-7. DOI: 10.1111/ajt.13142.