

‘Marcadores’ emocionales de respuestas (des)adaptativas en cáncer

Fusté, A.^{a,b}, Estapé, T.^c, Ruiz, J.^{a,b} y Estapé, J.^c

^a Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Universidad de Barcelona (UB)

^b Instituto de Neurociencias (UB)

^c Fundación para la Educación Pública y la Formación en Cáncer (FEFOC). Barcelona




<http://hdl.handle.net/2445/212922>

X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicología Oncológica (SEPO)

Barcelona, 5 ~ 7 junio 2024

Palau de les Heures ☞ Facultat de Psicologia (UB)

Campus Mundet




Objetivos




Participantes N = 321

Mujeres tratadas de **cáncer de mama** (Rango edad: 21-78 años. $\bar{X}_{edad} = 45,3 \pm 9,1$)

ESTUDIOS




ESTADO CIVIL



TIEMPO DE CIRUGÍA



TIPO DE CIRUGÍA



Instrumentos

HAD

(López-Roig et al., 2000)

Ansiedad

Depresión

Mini-MAC

(Andreu et al., 2018)

Espíritu de Lucha

Preocupación ansiosa

Desesperanza

Fatalismo

Evitación cognitiva


Análisis de datos

- ✓ Análisis de Conglomerados jerárquico (*método Ward*)
- ✓ Contraste de medias (*t de Student*)
- ✓ Magnitud de las diferencias (*g de Hedges*)
- ✓ Regresión Logística (*método Wald*)




Dendrograma (vinculación de Ward)

Matriz de distancias: Cuadrado de la distancia euclídea



Perfiles diferenciales

según el grado de severidad emocional



Ansiedad

$g = 2,4 [2,1; 2,7]$

Depresión

$g = 2,3 [1,9; 2,6]$

■ Bajo distrés ■ Alto distrés

Variables sociodemográficas o sociodemográficas

Magnitud de las diferencias
 g de Hedges


$g \geq 0,80$ Elevada
 $0,50 \leq g \leq 0,79$ Moderada
 $0,20 \leq g \leq 0,49$ Baja

Resultados (I)

Diferencias en adaptación (ajuste mental)

Magnitud de las diferencias
 g de Hedges


$g \geq 0,80$ Elevada
 $0,50 \leq g \leq 0,79$ Moderada
 $0,20 \leq g \leq 0,49$ Baja



Resultados (II)

‘Marcadores’ (factores de riesgo)

Variables Predictoras	β	ET	Wald	gl	p	OR	IC
Fatalismo (FA)	,197	,060	10,63	1	,001	1,218	1,08; 1,37
Preoc. Ansiosa (PA)	,093	,028	10,82	1	,001	1,097	1,04; 1,16



Hosmer y Lemeshow $\chi^2_{(8)} = 6,5$ $p = ,591$
 R^2 Nagelkerke = ,129

Clasificación correcta = 72,5% de los casos analizados

Área	ET	p	IC
,688	,034	< ,001	,62; ,76

Resultados (III)

1

La severidad de la *ansiedad* y la *depresión* permiten definir perfiles diferenciales de pacientes con cáncer de mama

2

Tales perfiles se asocian con diferentes respuestas desadaptativas, siendo el *Fatalismo (FA)* y la *Preoc. Ansiosa (AP)* los mejores “*marcadores*” de severidad emocional


3

Incidir terapéuticamente sobre tales “*marcadores*” redundará positivamente en el estado emocional y la respuesta adaptativa de las mujeres con cáncer de mama

Conclusiones



¡Si tiene preguntas,
no dude
en consultarlas!



<https://www.fefoc.org/>

Telf: (93) 217 21 82

Muchas gracias por su atención