

LA ENCUESTA DE FECUNDIDAD DE 1977 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Jesús M. de Miguel
(*Universitat Autònoma de Barcelona*)

En el año 1977 el Instituto Internacional de Estadística, bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas, promovió un estudio comparativo sobre pautas de fecundidad y control de natalidad en diversos países. El *Instituto Nacional de Estadística* (INE) español se encargó de la parte referente a nuestro país, diseñando una encuesta a 5.814 mujeres, casadas-alguna-vez (es decir, casadas, viudas, divorciadas y separadas), en edad teóricamente fértil, de 15 a 49 años de edad. Se trataba pues de las cohortes de mujeres nacidas entre 1927 y 1962.

Las entrevistas se realizaron entre los meses de noviembre y diciembre de 1977, y el informe final *Encuesta de fecundidad: Metodología y resultados* fue publicado en mayo de 1978 (con 227 páginas, más anexos). Se editó además un folleto —de supuesta difusión popular— con algunos de los datos más importantes: *La fecundidad en España: Diciembre 1977* (Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1978), 45 páginas. Salvo ese breve comentario de la citada encuesta sólo se publicaron las tablas estadísticas (y no todas), sin un análisis posterior. Hasta la fecha, la encuesta de fecundidad del INE es el estudio más completo e importante que existe en España sobre pautas de control de natalidad, y fecundidad. Desgraciadamente todavía no ha sido analizado en profundidad por la profesión sociológica.

La citada encuesta internacional, a pesar de los «retoques» de que fue objeto en España, se vio atacada desde los sectores más conservadores. Según el propio informe: «El compromiso a que había llegado la Dirección

del INE fue visto con recelo por determinados grupos sociales que iniciaron una campaña contra esta investigación esgrimiendo argumentos legales y mediante una campaña de prensa» (p. 8). De todas maneras no se pudieron incluir preguntas directas sobre métodos concretos de control de natalidad si no eran mencionados por la entrevistada, pues en aquellos momentos podía todavía considerarse como un delito de propaganda inmoral. A pesar de todo se continuó afirmando que la encuesta iba a «constituir un asalto a la vida íntima de los matrimonios con objeto de divulgar unos métodos que incluso podrían acarrear descomposición familiar» (p. 10).

La población total a investigar (el *universo*) supone 5,2 millones de mujeres «no solteras», y se obtuvieron 1,1 entrevistas por cada 1.000 mujeres (no solteras) de 15 a 49 años de edad, de todas las áreas geográficas de España. Aún, cuando me refiero a «mujeres-no-solteras» tan sólo un 2,2 % de la muestra son viudas, y un 0,9 % son divorciadas o separadas. Por ello, prefiero utilizar en sentido amplio «mujeres-casadas», pues el 97 % de la muestra está casada todavía, y generalmente sólo una vez. Tan sólo un 0,4 % de la muestra se refiere a mujeres que han estado dos veces casadas, y no hay casos de tres o más matrimonios. Tan sólo un 1,0 % de los matrimonios actuales son entre soltera y viudo; el 0,5 % entre viuda y viudo; y el 0,3 % entre viuda y soltero (a pesar de que hay más viudas que viudos).

En las tablas que siguen elaboro algunos de los datos más importantes, a partir de las estadísticas originales de la Encuesta de Fecundidad de 1977. Estos materiales de investigación son parte de un informe completo sobre población y control de natalidad en España, en prensa.*

* Agradezco la ayuda técnica de Lourdes Rubio Vergés y los comentarios y críticas de José L. Crespán.

TABLA 1

Conocimiento y utilización de métodos de contracepción
en España (1977)

<i>Métodos de contracepción</i>	<i>Porcentajes de mujeres casadas</i>		
	<i>Conocen el método</i>	<i>Lo han utilizado alguna vez</i>	<i>Lo utilizan en la actualidad^a</i>
DIU	30 %	0,6 %	0,5 %
Píldora	88 %	17,0 %	12,0 %
Diafragma	19 %	0,1 %	0,1 %
Condón	68 %	7,0 %	5,0 %
Ritmo	53 %	13,0 %	6,0 %
Coito interrumpido	70 %	31,0 %	23,0 %
Lactancia prolongada	34 %	0,4 %	0,0 %
Lavado vaginal	36 %	1,0 %	0,6 %
Ninguno	7 %	40,0 %	47,0 %
<i>Total</i>	(5.814)	(5.814)	(5.315)

Notas: a) No incluye las embarazadas. Actualmente (un 6 % de la muestra); pero sí incluye las que acaban de dar a luz y están todavía en el *post-partum* y las que están esperando quedar embarazadas (se podría calcular en un 8 % a un 10 % adicional); y el porcentaje de mujeres estériles que no pueden tener descendencia (5 % al 10 %). Es decir, entre el 19 % y el 26 % del total de mujeres de 15 a 49 años no necesitan controlar la natalidad.

Fuente: INE, *Encuesta de fecundidad* (Madrid: INE, 1978), pp. 156, 163 y 180.

TABLA 2

Utilización de métodos de contracepción por las mujeres casadas
menores de 25 años

<i>Métodos de contracepción</i>	<i>Porcentaje de mujeres casadas (menores de 25 años de edad)</i>		
	<i>Conocen el método</i>	<i>Lo han utilizado alguna vez</i>	<i>Lo utilizan en la actualidad ^a</i>
DIU	41 %	1,4 %	... ^b
Píldora	97 %	33,0 %	23,0 %
Diafragma	28 %	—	...
Condón	79 %	8,0 %	...
Ritmo	57 %	5,0 %	...
Coito interrumpido	78 %	24,0 %	...
Lactancia prolongada	38 %	—	...
Lavado vaginal	46 %	1,4 %	...
Ninguno	2 %	32,0 %	41,0 %
<i>Total</i>	(695)	(695)	(597)

Notas: a) No incluye las embarazadas.

b) El INE no ofrece estos datos en sus tablas.

Fuente: INE, *Encuesta de fecundidad* (Madrid: INE, 1978), pp. 156, 163, 187 y 188.

TABLA 3

Proporción de mujeres que controlan la natalidad, según el número de hijos tenidos

Número de hijas e hijos tenidos	% de mujeres casadas que			Total
	Nunca han controlado la natalidad	Han controlado pero no en la actualidad	Controlan actualmente la natalidad	
Ninguno	78 %	6 %	16 %	100 % (334)
Uno	41 %	12 %	48 %	(1.203)
Dos	36 %	11 %	53 %	(2.054)
Tres	35 %	13 %	52 %	(1.170)
Cuatro	36 %	11 %	53 %	(580)
Cinco o más ...	42 %	14 %	44 %	(473)
<i>Total</i>	<i>39 %</i>	<i>11 %</i>	<i>49 %</i>	<i>(5.814)</i>

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 195.

TABLA 4

Métodos de contracepción utilizados según el número de hijos

Método de contracepción utilizado actualmente	Número de hijas e hijos tenidos			
	Ninguno	Uno	Dos	Tres y más
Coito interrumpido	0,6 %	16,0 %	24,0 %	24,0 %
Píldora	6,0 %	16,0 %	12,0 %	9,6 %
Ritmo	1,5 %	4,6 %	6,4 %	6,3 %
Condón	0,0 %	4,4 %	4,5 %	5,2 %
Otros métodos	1,2 %	3,6 %	3,9 %	4,2 %
<i>Total</i>	<i>9,3 %</i>	<i>40,0 %</i>	<i>50,0 %</i>	<i>49,0 %</i>
	(334)	(1.203)	(2.054)	(2.223)

Nota: Incluye tan sólo las mujeres casadas actualmente, y expuestas al riesgo del embarazo, que utilizan métodos contraceptivos. Difiere, pues, de los totales de la Tabla 3 que se refiere a todas las mujeres no solteras, e incluye los casos de esterilización.

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 174.

TABLA 5

Proporción de mujeres casadas que controlan la natalidad, según la edad de la mujer

Grupo de edad de la mujer	% de mujeres casadas			Total
	Nunca han controlado la natalidad	Han controlado, pero no en la actualidad	Controlan actualmente la natalidad	
Menores de 25 años.	33 %	13 %	53 %	100 % (695)
25 a 29 años	34 %	9 %	57 %	(1.030)
30 a 34 años	31 %	11 %	58 %	(1.033)
35 a 39 años	38 %	9 %	53 %	(924)
40 a 44 años	43 %	11 %	46 %	(1.071)
45 años y más	54 %	15 %	31 %	(1.061)
<i>Total</i>	39 %	11 %	49 %	(5.814)

Nota: Del total se han descontado los casos en que no consta información acerca del control, aun cuando suponemos que controlan la natalidad muy por debajo de la media.
Fuente: INE, *Encuesta de fecundidad* (Madrid: INE, 1978), p. 192.

TABLA 6

Métodos de contracepción utilizados según la edad de la mujer

Métodos de contracepción que utilizan en la actualidad	% de mujeres (casadas) que controlan			Total
	Menores de 30 años	De 30 a 39 años	De 40 y más años	
Coito interrumpido	18,0 %	25,0 %	13,0 %	21,0 %
Píldora	20,0 %	11,0 %	2,2 %	11,0 %
Ritmo	4,1 %	7,8 %	3,4 %	5,7 %
Condón	5,3 %	5,2 %	2,2 %	4,5 %
Otros métodos	5,2 %	4,1 %	1,7 %	3,8 %
<i>Total</i>	52,0 % (1.725)	53,0 % (1.957)	23,0 % (2.132)	46,0 % (5.814)

Nota: Al igual que otras tablas sobre «métodos de contracepción utilizados» se refiere a mujeres actualmente casadas y expuestas al riesgo del embarazo. No incluye, pues, parejas esterilizadas.

Fuente: INE, *Encuesta de fecundidad* (Madrid: INE, 1978), pp. 155, 168 y 169.

TABLA 7

Métodos de contracepción utilizados según la religiosidad de la mujer

Método de contracepción utilizado actualmente	Religiosidad de la mujer			
	Católica practicante	Católica no practicante	Creyente de otra religión	No creyente
Coito interrumpido	21,0 %	20,0 %	22,0 %	17,0 %
Píldora	7,8 %	21,0 %	13,0 %	20,0 %
Ritmo	6,4 %	4,0 %	2,2 %	2,0 %
Condón	4,2 %	6,1 %	5,5 %	2,3 %
Otros métodos	3,2 %	6,1 %	1,1 %	7,0 %
<i>Total</i>	43,0 % (4.463)	57,0 % (961)	44,0 % (91)	49,0 % (300)

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978). p. 175.

TABLA 8

Utilización de métodos de contracepción por las mujeres católicas (casadas), en España y los Estados Unidos

Métodos de control	España, 1977		USA, 1973	
	Total	Católicas practicantes	Total	Católicas
Píldora	12,0 %	7,8 %	25,0 %	23,0 %
Condón	4,9 %	4,2 %	9,4 %	10,0 %
Ritmo	6,3 %	6,4 %	2,8 %	5,5 %
Coito interrumpido	23,0 %	21,0 %	1,5 %	1,9 %
Otros sistemas	6,8 %	3,2 %	31,0 % ^a	26,0 % ^b
Ninguno	47,0 %	57,0 %	30,0 %	34,0 %
<i>Total</i>	100 % (5.315)	(4.463)	(26.646)	(7.661)
% respecto del total ...	---	84,0 %	---	29,0 %

Notas: a) Fundamentalmente: esterilización (16 %), DIU (7 %), espuma (3 %) y diafragma (2 %).

b) Fundamentalmente: esterilización (18 %), DIU (6 %), espuma (3 %), y diafragma (2 %).

Fuentes: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), pp. 175 y 180.

Kathleen Ford, *Contraceptive Utilization in the United States* (Hyattsville, Md.: National Center for Health Statistics, 1979), pp. 14, 31 y 32.

TABLA 9

Proporción de mujeres casadas que controlan la natalidad
según el nivel de estudios de la mujer

Estudios de la mujer	% de mujeres que ^a			Total ^b
	Nunca han controlado la natalidad	Han controlado, pero no en la actualidad	Controlan actualmente la natalidad	
Superiores	17 %	19 %	63 %	100 % (68)
Medios	18 %	17 %	64 %	(198)
Bachillerato superior...	21 %	20 %	60 %	(232)
Bachillerato elemental .	25 %	15 %	60 %	(392)
Primaria	40 %	10 %	49 %	(3.353)
Sin estudios	46 %	10 %	43 %	(1.053)
Analfabetas	48 %	12 %	40 %	(515)
<i>Total</i>	39 %	11 %	49 %	100 % (5.810)

Notas: a) Técnicamente mujeres no solteras.

b) No se incluyen los casos en que no consta la información sobre control de natalidad.

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 194.

TABLA 10

Proporción de mujeres casadas que controlan la natalidad,
según sus estudios y deseos de embarazo

Estudios de la mujer	% de mujeres casadas que controlan la natalidad	
	Sí desean otro embarazo	No desean otro embarazo
Superiores	63 %	55 %
Medios	54 %	73 %
Bachillerato superior	66 %	63 %
Bachillerato elemental	49 %	65 %
Primaria	53 %	53 %
Sin estudios *	43 %	49 %
<i>Total</i>	52 %	54 %
	(758)	(1.801)

Nota: a) Se incluyen en este caso también las «analfabetas».

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), pp. 217-219.

TABLA 11

Métodos de contracepción utilizados según los estudios de la mujer

Estudios de la mujer	% de mujeres casadas (y no embarazadas) que actualmente utilizan algún método de contracepción					Total
	Coito interrumpido	Píldora	Ritmo	Condón	Otros métodos	
Superiores	0,0 %	41,0 %	8,8 %	2,9 %	7,4 %	60 % (68)
Medios	5,5 %	27,0 %	14,0 %	5,5 %	5,0 %	57 % (198)
Bachillerato superior	5,2 %	22,0 %	15,0 %	6,5 %	7,8 %	57 % (232)
Bachillerato elemental	8,9 %	17,0 %	12,0 %	4,8 %	8,6 %	51 % (392)
Primaria	22,0 %	10,0 %	5,8 %	5,3 %	3,0 %	46 % (3.353)
Sin estudios	27,0 %	6,2 %	1,8 %	1,9 %	3,7 %	41 % (1.053)
Analfabetas	26,0 %	3,9 %	0,4 %	3,7 %	2,7 %	37 % (515)
<i>Total</i>	21,0 %	11,0 %	5,7 %	4,5 %	3,8 %	46 % (5.810)

Nota: Son datos referentes a mujeres casadas actualmente y expuestas al riesgo del embarazo.

Véanse también las notas de las Tablas 4 y 6.

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 170.

TABLA 12

Métodos de contracepción utilizados según la clase social

Clase social (según la ocupación del marido)	% de mujeres casadas (y no embarazadas) que actualmente utilizan algún método de contracepción					Total
	Coito interrom- pido	Píldora	Ritmo	Condón	Otros métodos	
URBANA:						
Empresarios*	18,0 %	5,1 %	7,6 %	3,2 %	3,8 %	37 % (158)
Cuadros superiores .	4,8 %	24,0 %	16,0 %	4,1 %	4,8 %	54 % (315)
Cuadros medios	14,0 %	18,0 %	11,0 %	6,3 %	6,3 %	55 % (1.129)
Trabajadores indepen- dientes	27,0 %	8,6 %	4,8 %	4,6 %	3,9 %	49 % (544)
Obreros especializados	25,0 %	9,5 %	3,5 %	5,2 %	3,0 %	46 % (2.192)
Peones (obreros no especializados)	23,0 %	6,1 %	1,2 %	4,9 %	2,2 %	37 % (493)
RURAL:						
Propietarios ^b	19,0 %	3,0 %	5,1 %	0,3 %	1,2 %	28 % (333)
Jornaleros	28,0 %	1,7 %	1,4 %	1,2 %	4,3 %	37 % (419)
<i>Total</i> ^c	21,0 %	11,0 %	5,7 %	4,5 %	3,8 %	46 % (5.814)

Notas: a) En las tablas originales se trata de «empresarios con asalariados», pero no se distingue si son urbanos o rurales.

b) «Empresarios agrarios sin asalariados y miembros de cooperativas agrarias».

c) Incluye 231 casos de «activos no clasificables».

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 176.

TABLA 13

Métodos de contracepción utilizados según los estratos de población

Métodos que utilizan actualmente de contracepción	Tamaño del municipio				Total
	Grandes ciudades	Más de 50.000 habitantes	De 10.000 a 50.000 habitantes	Hasta 10.000 habitantes	
Coito interrumpido .	15,0 %	21,0 %	23,0 %	23,0 %	21,0 %
Píldora	23,0 %	11,0 %	9,1 %	3,4 %	11,0 %
Ritmo	1,4 %	7,5 %	3,5 %	4,0 %	5,7 %
Condón	4,2 %	6,2 %	3,7 %	3,0 %	4,5 %
Otros métodos	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,2 %	3,8 %
<i>Total</i>	56,0 % (943)	50,0 % (2.106)	42,0 % (1.259)	36,0 % (1.507)	46,0 % (5.814)

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 169.

TABLA 14

Métodos de contracepción utilizados en las diversas regiones

Regiones del INE	% de mujeres casadas (y no embarazadas) que actualmente utilizan algún método de contracepción					Total
	Coito interrumpido	Píldora	Ritmo	Condón	Otros métodos	
Castilla la Nueva y Extremadura	23 %	13,0 %	6,3 %	6,3 %	4,3 %	53 % (1.150)
Andalucía y Canarias ...	28 %	9,6 %	3,2 %	5,1 %	5,4 %	51 % (1.140)
Cataluña	17 %	19,0 %	6,1 %	4,7 %	3,4 %	50 % (1.032)
País Vasco y Aragón ...	22 %	7,1 %	11,0 %	2,9 %	2,3 %	46 % (589)
Baleares, Valencia y Murcia	18 %	7,2 %	5,9 %	4,3 %	4,4 %	40 % (834)
Galicia y Asturias	19 %	5,7 %	2,8 %	3,3 %	2,1 %	33 % (612)
Castilla la Vieja y León.	14 %	7,0 %	5,4 %	2,0 %	2,8 %	31 % (458)
<i>Total</i>	21 %	11,0 %	5,7 %	4,5 %	3,8 %	46 % (5.814)

Fuente: INE, Encuesta de fecundidad (Madrid: INE, 1978), p. 168.