

DE FLORA DIANICAE

Breve aportación al catálogo provincial de RIGUAL (*Flora y Vegetación de la provincia de Alicante*. Inst. Est. Alicantinos, 1972), a la par que se recuerda la estancia de ROUY en este enclave (Excursions botaniques en Espagne. *Bull. Soc. Bot. France* 31:33-41, 52-56. 1884). En el trabajo de Rouy, que no menciona el señor Rigual, se recogen no pocas novedades, algunas de indudable interés para la flora alicantina. De las mismas, aquí nos limitaremos a transcribir las que hemos podido testificar en el campo.

Señalamos con un asterisco (*) las novedades al mencionado catálogo. Coordenadas UTM en cuadrículas de 10 Km de lado. Designación de uso y zona para todas las localidades: 31S. Testimonios: herbario de la Facultad de Farmacia de Barcelona (BCF).

***Minuartia geniculata** (Poiret) Thell.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 59), 450 m, en el *Teucrio-Hippocrepidetum valentinae*, 2-IV-1980, Blanché, Molero & Pujadas.

***Sagina maritima** G. Don

Denia (BD 40), en un prado arenoso húmedo, con *Trifolium dubium* Sibth. y *T. tomentosum* L., 10-V-1980, Molero & Rovira.

***Malcolmia littorea** (L.) R. Br.

Abunda en las proximidades de Denia, hacia Oliva (BD 40), 10-V-1980, Molero & Rovira. Indicada por Rouy (*l.c.*) de San Nicolás.

Crambe hispanica L.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 59), al pie de un cantil muy soleado, en el *Teucrio-Hippocrepidetum valentinae*, 3-IV-1980, Blanché, Molero & Pujadas.

Ejemplares robustos, de tallos y hojas hispidas en la mitad inferior, hojas basales con lóbulo terminal suborbicular agudo (no reniforme suborbicular), pedúnculos fructíferos de hasta 8 mm de longitud y segmentos superiores del fruto de hasta 5 mm de diámetro. Presenta por tanto caracteres intermedios entre la var. típica y la var. *glabrata* (DC.) Coss., que ROUY (*l.c.*, ut *C. glabrata* DC.) señala en la próxima Sierra de Segarria. Este hecho ya fue constatado por MAIRE (*Fl. Afri. Nord* 12:358. 1965) para algunas poblaciones de Marruecos, lo que confirmaría, a duras penas, el rango varietal como el más adecuado a la planta de Candolle.

***Saxifraga tridactylites** L.

Cumbre del Montgó occidental (BC 49), 680 m, escasa en un rellano arenoso calcáreo, 10-V-1980, Molero & Rovira.

Silene tridentata Desf.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 49), 630 m, 10-V-1980, Molero & Rovira. Indicada por RIGUAL (*l.c.*) de la Peña de Jijona.

***Medicago ciliaris** (L.) All.

Denia, hacia Oliva (BD 40), en un viñedo abandonado, sobre suelo arenoso, 10-V-1980, Molero & Rovira. Su área de distribución española se restringe prácticamente al sur peninsular. Novedad para Levante.

***Lotus ornithopodioides** L.

Montgó occidental (BC 49), pastos culminales, 650 m, 28-V-1980, *Molero & Rovira*. Peñón de Calpe (BC 48), 27-V-1980, *Molero & Rovira*.

***Hippocrepis biflora** Sprengel

H. unisilicosa auct. eur. occ., non L.

Denia, hacia Oliva (BD 40), en un yermo arenoso, 27-V-1980, *Molero & Rovira*.

Malva stipulacea Cav.

Denia, solanas al pie del Montgó (BC 59), 27-V-1980, *Molero & Rovira*. Abunda igualmente en la cumbre del Montgó. Ya indicada por RIGUAL (*l.c.*) de la provincia.

***Oenothera rosea** L'Her. ex Aiton

Campos de Denia, hacia Oliva (BD 40), 10-V-1980, *Molero & Rovira*.

***Trinia glauca** (L.) Dumort. subsp. **glauca**

Calveros del Montgó, entre Denia y Xàvea (BC 59), sobre pendientes pedregosas o en suelos esqueléticos con ligera inclinación, 10-V-1980, *Rovira & Molero*.

***Smyrniolum satrum** L.

Sobre Jesús Pobre, al pie del Montgó (BC 49), en un herbazal húmedo, 3-V-1980, *Blanché, Molero & Pujadas*.

Bupleurum gibraltarium Lam.

Montgó occidental (BC 49), en el roquedo cumbreño de umbria, 680 m, 27-V-1980, *Molero & Rovira*. Indicada por RIGUAL (*l.c.*) de la provincia.

***Daucus durieua** Lange

Denia, hacia Oliva (BD 40), en un campo arenoso, 27-V-1980, *Molero & Rovira*. Ya mencionada por ROUY (*l.c.*) de Benitachel.

***Centaureum linariifolium** (Lam.) G. Beck subsp. **linariifolium** s.s.

Acantilados marítimos del cabo de San Antonio (BC 59), en lugares abrigados, 27-V-1980, *Molero & Rovira*. Alcanza por tanto el litoral alicantino (cf. LÓPEZ, *Anales Jard. Bot. Madrid* 36:125. 1979).

***Blacstonia perfoliata** (L.) Hudson subsp. **grandiflora** (Viv.) Maire in Jahandiez & Maire

Entre Denia y Xàvea (BC 59), junto a una acequia, 10-V-1980, *Molero & Rovira*. Proximidades de Gata (BC 49), 11-V-1980, *Molero & Rovira*. Indicada de entre Denia y Ondara por ROUY (*l.c.*), única localidad española que recoge WILLKOMM (*Suppl. Prod. Fl. Hisp.*, 193. 1893).

***Cuscuta epithimum** (L.) L. subsp. **kotschyi** (Desmoulins) Arcangeli

Cabo de la Nao (BC 59), sobre *Fumana laevipes* (L.) Spach., 29-III-1980, *Blanché, Molero & Pujadas*.

***Phlomis purpurea** L.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 49), muy abundante en el matorral

del *Rosmarino-Ericion* basal, 350-400 m, 28-V-1980, *Molero & Rovira*. Rouy (*l.c.*) ya la menciona de la Sierra de Segarria.

****Evax pigmaea* (L.) Brot. subsp. *pigmaea***

Denia, hacia el cabo de San Antonio (BC 59), en los rellanos arenosos del acantilado marítimo, 10-V-1980, *Molero & Rovira*. Indicada por Rouy (*l.c.*) de San Nicolás.

****Crepis sancta* (L.) Babcock**

Calveros del Montgó, entre Denia y Xàvea (BC 59), 10-V-1980, *Molero & Rovira*. Rouy (*l.c.*) la menciona de Gata.

****Ornithogalum umbellatum* L.**

Cumbre del Montgó occidental (BC 59), 700 m, 28-V-1980, *Molero & Rovira*. Indicada del lugar por Rouy (*l.c.*).

***Catapodium marinum* (L.) C. E. Hubbard**

C. loliaceum (Hudson) Link, nom. illeg.

Denia, hacia Xàvea (BC 59), en pequeños rellanos arenosos del acantilado marítimo, 10-V-1980, *Molero & Rovira*. Rouy (*l.c.*) la cita del Peñón de Ifach. RIGUAL (*l.c.*) del torreón de Campello.

****Orchis coriophora* L. subsp. *fragans* (Pollini) Sudre**

Denia, hacia Xàvea (BC 59), en un pinar aclarado, 10-V-1980, *Molero & Rovira*. Los ejemplares de esta población, inodoros, mantienen el labelo entre los 5-6 mm, igual o algo más corto que el espolón, medidas que no se ajustan al criterio de R. DE Soó (*Flora Europaea* 5:339. 1980). Al acudir al BC observamos que nuestras medidas se mantienen para otras poblaciones catalanas, levantinas y andaluzas atribuibles a esta subespecie. Las poblaciones del centro y occidente peninsular, que se han referido a *O. coriophora* var. *carpetana* Willk., se separan claramente por su robustez, labelo que se mantiene entre los (5)-6-8 mm y el espolón, entre una vez y media a dos veces mayor, lo que tampoco se ajusta a lo que R. DE Soó (*l.c.*) incluye en una subsp. *martinii* (Timb.-Lagr.) Nyman, de labelo más corto (5-6 mm). Un buen carácter para separar ambos táxones parece ser la relación espolón/labelo, igual o subigual para la subsp. *fragans*, de una vez y media a dos veces mayor para la var. *carpetana* (subsp. *martinii*?). A este último taxon habrá que referir muchas de las poblaciones del NE peninsular (Pirineo oriental: Cerdanya, Vall de Ribes; Penyalgosa), tal nos demuestran los testimonios que se conservan en BC, y ampliar por tanto el área de distribución que le concede *Flora Europaea* (*l.c.*).

****Orchis mascula* (L.) L. subsp. *obiensi* (Reuter ex Grenier) Asch. & Graebner.**

Prados culminales del Montgó occidental (BC 49), 700 m, 2-IV-1980, *Blanché, Molero & Pujadas*.

Julián MOLERO & Ana M. ROVIRA. Cátedra de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona.