

amarilla; sépalos externos estrechamente lanceolados (no ovales, diferencia con *H. croceum* subsp. *suffruticosum*).

Manuel PEINADO LORCA & José María MARTÍNEZ PARRAS. Departamento de Botánica. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

**STERNBERGIA COLCHICIFLORA WALDTS. & KIT.
EN EL VALLE DEL EBRO**

Especie nueva para la flora catalano-aragonesa, encontrada en la Serreta Negra de Fraga y en la Valcuerna de Candanos. Esta planta de origen pónico mediterráneo, debe añadirse a la lista de especies esteparias del Mediterráneo Oriental que se refugian en el Vedat de Fraga (O. DE BOLÒS, *Mem. Real Acad. Barcelona* 42, n.º 6, 1973).

P. Montserrat, recolectó para siembra, en el Vedat de Fraga, bulbos de *Colchicum triphyllum*. Entre ellos, floreció, en 1981, *Sternbergia colchiciflora* (com. oral).

Esta rara estirpe, aparece de forma esporádica por algunos puntos del sur y del centro de la Península Ibérica (BELLÓT, *Collect. Bot. (Barcelona)* 7(1): 91-100, 1968).

Localidades: HUESCA: Candanos, La Valcuerna (BF 59), 300 m, valonada temporalmente inundada con *Astragalus turoletensis* y *Boleum asperum*. 29-4-1982. Leg. Molero & J. M. Montserrat (BC 640198); Baix Cinca, Serreta Negra de Fraga, Els Boixos (BF 58), 280 m, comunidad de *Iris spuria* y *Festuca rubra* O. de Bolòs 1973, 29-4-1982, leg. Molero & J. M. Montserrat.

Julián MOLERO. Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona.

José María MONTSERRAT MARTÍ. Instituto Botánico de Barcelona, Av. dels Muntanyans, s/n. Barcelona-4.

**NUEVAS CITAS DE TETRAGONOLOBUS CONJUGATUS
SUBSP. REQUIENII (MAURI & SANGUINETTI)
E. DOMÍNGUEZ & E. F. GALIANO (FABACEAE) PARA
LA PENÍNSULA IBÉRICA**

Este taxon de distribución mediterránea, se encontraba representado en la Península Ibérica (DOMÍNGUEZ & GALIANO, *Lagascalia* 8:189-214), sólo por cuatro citas en las provincias de Barcelona, Cádiz y Sevilla, disyunción que nos hizo pensar en una mayor representación en nuestro país. Esta presunción se vio corroborada en nuestras campañas por el sur de Andalucía, habiéndose recolectado en cuatro nuevas localidades siempre en alturas superiores a 500 m, en praderas húmedas al pie de roquedos calizos o en bordes de caminos de las mismas zonas, formando en algunos casos poblaciones muy densas de hasta cincuenta individuos.

CÓRDOBA: Carcabuey, entre Cabra y Carcabuey, km 24, 700 m, bordes de la carretera, 21-V-1981, Domínguez & al., COFC. Priego de Córdoba, Sierra de Albayate, las Navas, 800 m, 23-VI-1979, Domínguez & Muñoz, COFC.

MÁLAGA: Ronda, Sierra de las Nieves, Los Quejigares, 1200 m, praderas, 12-V-1982, Domínguez & al., COFC. Entre Alozaina y Casarabonela, bordes de carretera, 650 m, 28-IV-1982, Domínguez, Ruiz de Clavijo & Ubera, COFC.

SEVILLA: Algámitas, subida al Peñón de Algámitas, 850 m, praderas, 14-V-1982, Domínguez & al., COFC.

Eugenio DOMÍNGUEZ & Jesús M. MUÑOZ. Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Avda. de Medina Azahara, s/n. Córdoba.