

Notas florísticas

por

J. VIGO

Las siguientes notas botánicas se refieren exclusivamente al valle de Ribes, zona en la que vengo realizando excursiones desde hace varios años.

Lycopodium selago L. — No escaso en el Torrent del Duc (Els Coforns) cerca de Ribes de Freser, a unos 1100 m.

Ranunculus thora L. — Vertiente norte de Sant Amanç (Bruguera), 1700 m ; frecuente en los rellanos calizos que ciñen dicha montaña.

Ranunculus flammula L. — Ribes de Freser, junto a la Font de la Margarideta, 950 m.

Anemone ranunculoides L. — Zona sudoriental del valle. Sant Amanç, en los claros del hayedo, 1650 m ; Torrent de Conivella (Ribes de Freser), 1300-1400 m ; Les Nouffonts (Pardines), 1575 m.

Actaea spicata L. — En el *Scillo-Fagetum*. Sant Amanç (1600-1700 m) y hacia la Collada Verda (1450 m). VAYREDA la cita de Núria y Querals, y TEIXIDOR de la Coma de Vaca (VAYREDA, *Flora de la Vall de Núria*, pág. 3 ; CADEVALL, *Flora de Catalunya*, 1 : 56) ; en estos lugares debe ir ligada a otra asociación, puesto que no existen hayedos.

Arabis serpyllifolia Vill. — Sant Amanç, 1750 m.

Cardamine pinnata (Lam.) R. Br. — Hayedos, sobre todo en el *Scillo-Fagetum*. Sant Amanç, 1600-1700 m, desde donde baja por el Torrent de la Corba; cerca de la Collada Verda, 1450 m. VAYREDA la cita de Ribes y Queralbs (CADEVALL, l. c., I:139).

Cardamine digitata (Lam.) O. E. Schulz. — VAYREDA la señala en Sant Amanç (CADEVALL, l. c., I:139), donde he podido comprobar su existencia, aunque es mucho menos frecuente que la especie anterior.

Según CADEVALL, fue hallada por SALVADOR en el Montseny. En el herbario de este último botánico existe realmente un ejemplar de *Dentaria digitata* cuya etiqueta dice: «*In Alpibus Liguriae frequens; et in Monte Signato et in Pyrenaeis*»; resulta, pues, muy inseguro que fuera recogido en dicha localidad. No existe ninguna otra cita de esta crucífera referente al Montseny; por consiguiente, parece lógico considerar dudosa su presencia en dicho macizo.

Rhamnus alaternus L. — Aigües de Ribes, en el acantilado de las Coves de Ribes, 850 m.

Pistacia terebinthus L. — En el mismo lugar que la especie precedente.

Pyrola uniflora L. — En los bosques del alianza *Vaccinio-Piceion*; Bosc d'Estremera (Queralbs), 1900 m; Sant Amanç, 1700 m.

Pyrola minor L. — Más frecuente que la anterior. Sant Amanç, 1700 m; Vall Estremera, 1400 m; Bosc de Ribes, 1350 m.

Monotropa hypopitys L. subsp. **hypopitys**. — Bosc de Campelles (*Galio-Abietetum albae*), 1600 m; Bosc de Ribes (*Saxifrago-Rhodoretum pinetosum*), 1850 m.

Coronilla minima L. subsp. **Clusii** (Duf.) Murb. — Aigües de Ribes, en el peñasco de las Coves de Ribes, 850 m.

Colutea arborescens L. — Ribes de Freser, hacia Can Gorra (1050 m) en el *Buxo-Quercetum*.

Potentilla alchemilloides Lap. — Vertiente sur de Sant Amanç, en las rocas calcáreas, 1750 m.

Epilobium angustifolium L. — Ribes de Freser, de La Falgosa a Conivella, 1350 m; Bac de l'Eura, 1150 m; Sant Amanç, 1650 m. Citada de Queralbs y Núria por VAYREDA (CADEVALL, *Flora de Catalunya*, II:333).

Saxifraga aizoon Jacq. — Es una de las saxífragas más corrientes en las rocas y pedregales. Núria; Vall Estremera (Queralbs), 1350 m; Torrent Roig (Bruguera), 1450 m; La Vallsera (Pardines), 1300 m.

Eryngium × **Chevalieri** Sennen (= **E. campestre** × **E. Bourgati**). — Ca la Xeca (Ribes de Freser), 1300 m.

Lonicera etrusca Santi. — En el *Buxo-Quercetum*, más bien en lugares abrigados y expuestos al sur. Ribes de Freser, Angelats, 1000-1100 m.

Lonicera nigra L. — Bosc d'Estremera, 1450 m. (*Vaccinio-Piceion*). Sant Amanç, 1650 m, y hacia la Collada Verda, 1450 metros (*Scillo-Fagetum*).

Lonicera alpigena L. var. *semiconnata* Zabel. — Sant Amanç, 1700 m, canchal calizo.

Rubia peregrina L. — Se refugia en lugares abrigados; en rocas soleadas o dentro del *Buxo-Quercetum*. Torrent de La Corba, 1000 m; entre Aigües de Ribes y La Baells, 1000 m.

Galium mollugo L. subsp. **mollugo** (= *G. elatum* Thuill). — Sant Amanç, 1675 m.

Valeriana tripteris L. — Els Coforns (Ribes de Freser) junto a la Cova del Duc, 1275 m.

Dipsacus pilosus L. — Ogassa (Ripollès) 1350 m; Ribes de Freser, frecuente en las alisedas del río Segadell, 950-1000 m. CADEVALL lo cita de La Corba, al sur de Ribes (*Flora de Catalunya*, III : 233).

Vinca minor L. — Ca la Xeca (Ribes de Freser), 1300 m.

Gentiana kochiana Perr. et Song. — Vertientes del monte Taga, en prados umbríos. Mas Conill, 1300 m (individuos raquíuticos floridos a principios de mayo); Clots de la Maçana, 1300 metros; cerca de la Font del Bisbe, 1400 m; sobre el Torrent de Conivella, 1700 m. Citada de Montgrony (CADEVALL, l. c., IV : 115), localidad relativamente cercana.

Gentiana pneumonanthe L. — Santa Catarina (Ribes de Freser), abundante en los prados húmedos a ambos lados del torrente, 1100 m.

Esta genciana, al parecer muy rara en Cataluña, sólo había sido citada, como localidad concreta, de los prados del Mas Arabó en la Cerdaña (CADEVALL, l. c., IV : 114).

Lithospermum fruticosum L. — Vertiente sur de Sant Amanç, rocas calcáreas a 1750 m de altitud, donde convive con *Thymelaea dioica* y *Potentilla alchemilloides*.

Pulmonaria affinis Jord. — CADEVALL la cita del valle de Ribes e indica que no es escasa. Sólo la he visto en los hayedos de Sant Amanç (1600-1700 m) y de la Collada Verda (1450 m).

Pedicularis silvatica L. — Santa Catarina (Ribes de Freser), en praderas turbosas, 1075 m.

Lamium galeobdolon (L.) Crantz. — Hacia la Collada Verda (1450 m) en el *Scillo-Fagetum*.

Thymelaea dioica All. — No rara en las rocas calcáreas, preferentemente en lugares soleados. Vall Estremera y Gorges del Freser (Queralbs), desde 1400 m ; Sant Amanç, 1700-1800 m.

Euphorbia angulata Jacq. — Citada por VAYREDA en Sant Amanç (CADEVALL, l. c., v : 128). Los ejemplares recogidos en este lugar parecen corresponder realmente a tal especie.

Scilla lilio-hyacinthus L. — Hacia la Collada Verda (1450 metros) en el *Scillo-Fagetum*.

Paris quadrifolia L. — En Sant Amanç, 1650 m, y cerca de la Collada Verda, 1450 m (*Scillo-Fagetum*). Señalada por CADEVALL en Núria (l. c., II : 282).

Polygonatum verticillatum L. — Abundante en el hayedo de Sant Amanç (1600-1700 m) y en el abetal de Campelles (1500-1600 m). La Vallsera (Pardines), refugiado entre las matas de boj, 1600 m.

Ruscus aculeatus L. — Encima de Torroella (Ribes de Freser), 1150 m, en el *Buxo-Quercetum*.

Crocus albiflorus Kitt. (= *C. vernus* Wulf). — Sant Amanç, 1750 m ; Pla de les Teuleries (Campelles), 1575 m.

Crocus nudiflorus Sm. — Coll de Jou (Bruguera), 1600 m ; hacia el Torrent del Salt del Grill (Queralbs), 1700 m. Indicado por VAYREDA en el Pla d'Anyella, extremo occidental del valle (CADEVALL, l. c., v : 299).

Orchis militaris L. — Vilaró (Pardines), cerca de la capilla de Santa Magdalena, 1275 m.



Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. — Sant Amanç, 1750 metros; entre El Sagnari y Saltor (1100 m), en el *Buxo-Fagetum*.

Listera cordata (L.) R. Br. — Solana del Bosc de Ribes, junto al Pla de les Basses de Dalt, 1800 m. Encontrada anteriormente por la señora Montserrat GARRIGA DE GALLARDO en Núria (*Cavanillesia* I, 1928, P. FONT QUER, *De flora occidentale adnotationes*, pág. 24).

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. — Sobre El Sagnari (1250 m), en el *Buxo-Fagetum*.

Juncus trifidus L. — Els Coforns (Ribes de Freser), sobre roca silíceas, 1275 m. Señalada en Noufonts (Núria) y Pont de Cremal (Queralbs) (CADEVALL, l. c., v : 419).

Luzula pilosa (L.) Willd. — En una excursión que hice con el Dr. O. de BOLÓS a Sant Amanç la encontramos en el hayedo (1650 m).

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. — Ribes de Freser: Prat del Duc (Els Coforns), 1275 m; Bac de l'Heura, 1100-1150 m, no escasa. Fr. SENNEN la había indicado en Núria (CADEVALL, l. c., VI : 154).