

A propòsit de les comunitats de *Nerium oleander*

Oriol de BOLÒS

ABSTRACT

BOLÒS O. de, 1985: On the *Nerium oleander* communities. Collect. Bot. 16(1): 227-228.

A new West-Mediterranean alliance, *Rubo ulmifolii-Nerion oleandri* is briefly described.

RESUMEN

BOLÒS, O. de, 1985: Sobre las comunidades de *Nerium oleander*. Collect. Bot. 16(1): 227-228.

Se describe brevemente una nueva alianza, *Rubo ulmifolii-Nerion oleandri*, de la parte occidental de la región mediterránea.

J. IZCO, F. FERNÁNDEZ i A. MOLINA, en una recent revisió de l'ordre *Tamaricetalia* (1984), manifesten l'opinió, que compartim, segons la qual les bosquines de les rambles de la part occidental de la regió mediterrània no han d'ésser incloses dins el *Nerion oleandri* Eig 1946. Això fa necessari l'establiment d'una aliança nova per a incloure-les:

Rubo ulmifolii-Nerion oleandri, all. nova

Tàxons característics (en part territorials): *Nerium oleander* L., *Vitex agnus-castus* L., *Lonicera biflora* Desf., *Lavatera olbia* L., *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. subsp. *simorrhinum* (Durieu) Maire & Weiller, *Leucojum aestivum* L. subsp. *pulchellum* (Salisb.) Briq.

Fisiognomia, ecologia i geografia: Comunitats poc denses d'arbusts o d'arbrissos, amb sobabosc principalment heliòfil. Són pròpies de les rambles (= uadis) on l'aigua circula rarament, sols en temps de pluges. De caràcter termòfil, es fan a la part occidental de la regió mediterrània i, principalment, al territori austromediterrani, domini de l'*Oleo-Ceratonion*, encara que poden penetrar fins a les parts més temperades del domini del *Quercion ilicis*.

Associació tipus: *Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri*: (*Rubeto-Nerietum oleandri*) O. Bolòs 1956, Collect. Bot. (Barcelona) V: 236-238. Àrea: Península Ibèrica E, Eivissa, Provençal (?)...

Altres associacions:

Vinco majoris-Viticetum agri-casti O. Bolòs 1956, Collect. Bot. (Barcelona): V: 238-240. Àrea: Península Ibèrica NE.

Leucojo pulchelli-Viticetum agni-casti O. Bolòs, R. Mol. et P. Monts. 1970, Acta Geobot. Barcinonensis V: 44-47, Barcelona. Inventari tipus: Tabl. 7, nr. 4. Altra referència: O. BOLÒS & R. MOLINIER: Collect. Bot. (Barcelona) V: 743-745, 1958. Àrea: Illes Gimnèsies.
Rubio longifoliae-Nerietum oleandri Alcaraz, inèd.

BIBLIOGRAFIA

- BOLÒS, O. DE, 1956: De Vegetatione Notulae, II. Collect. Bot. (Barcelona) V: 195-268.
BOLÒS, O. DE & R. MOLINIER, 1958: Recherches phytosociologiques dans l'île de Majorque. Collect. Bot. (Barcelona) V: 699-865.
BOLÒS, O. DE, R. MOLINIER & P. MONTSERRAT, 1970: Observations phytosociologiques dans l'île de Minorque. Acta Geobot. Barcinonensis, 5.
IZCO, J., F. FERNÀNDEZ, A. MOLINA, 1984. El orden *Tamaricetalia* Br.-Bl. & Bolòs 1957 y su ampliación con los tarayales hiperhalófilos. Doc. phytosociol. N. S., VIII: 377-392.